
PHARMACOPŒIA
BRUXELLENSIS.
Harrewyn fecit

PHARMACOPOEA
BRUXELLENSIS
SENATÛS
AUTHORITATE
MUNITA.

EDITIO ALTERA.



BRUXELLIS,
Typis FRANCISCI FOPPENS.

M. DCCII.



NOBILISSIMO
AMPLISSIMOQUE
SENATUI BRUXELLENSI.

Nobilissimi Amplissimique Domini,



Mendatiorem Pharmaco-poœam in lucem edituri non diu hæsimus dubii cui potissi-

tiſſimùm nomini eam dedicaremus: Etenim cùm vos & Civium Veſtrorum incolumitati ſtudio indefeſſo proſpicere & ſaluti omnibus modis conſulere, & ut florentes ac beati vitam agant paternâ benevolentiâ curare non deſinatis, alia auſpicia quàm Veſtra aliudque patrocinium non potuit opus hoc jam pulchrius renaſcens deſiderare. Nam ſanitati & vitæ

tum Veſtræ quæ nobis, tum Veſtrorum Civium quæ vobis tam chara eſt mirificè proſpicit, dum quo pondere quâ menſurâ compoſitiones & mixturæ vel ad tollendos morbos vel ad præſervandam à morbis valetudinem vel ad curanda vulnera fieri debeant, accuratè, breviter ac dilucidè præſcribit. Non licet in his ſine valetudinis aut etiam vitæ

periculo errare. His diligenter ſervatis medela ſperanda eſt & corporum ſanitas, quæ ad publicum bonum augendum ornandumque conducit. Veſtris itaque prodit auſpiciis, à Veſtro nomine ſplendorem autoritatemque accipiet, nec Zoïlorum dentes, Veſtro tutum patrocinio opus mole exiguum utilitate magnum pertimeſcet: hoc vobis addito veteri illo

ὑγιαίνειν καὶ εὐπράττειν,
ſuoſque pariter labores
Machaoniamque ar-
tem conſecrant

Nobiliſſimi, Ampliſſimique Domini,

Humillimi clientes

COLLEGII MEDICI ASSESSORES.

EXTRACTUM

Ex Mandato Nobil. & Ampliss. Magistratûs super hoc dispensatorium.

UT sit ordo generalis & uniformitas in dispensatione remediorum in omnibus hujus urbis Pharmacopoliis mandat NOBILISS. ET AMPLISS. SENATUS, quòd omnes Pharmacopœi inposterum teneantur sequi hoc dispensatorium à *Coll. Med. Assess.* dicti Senatûs autoritate evulgatum omnesque in eo contentas compositiones sic conficere & in officinis asservare sub multâ duodecim florenorum pro quacumque quæ aliter facta, in visitatione officinarum suo tempore facienda invenietur, interim in casu difficultatis vel dubii quod iidem Pharmacopœi teneantur Colleg. Med. consulere antequam pro arbitrio suo aliquid mutare possint. Publicatum Bruxellis die 20. Martii 1702.

Signatum C. ZEGHERS.

BENE-



BENEVOLO LECTORI.

HÆc est tertia Pharmacopœæ nostræ facies, quam necessitas extorsit. Cùm ultimæ Editionis nulla ampliùs extarent exemplaria, nos ad aliam evulgandam accingere coacti fuimus. Quapropter hanc damus non novam, sed ultimam hinc inde emendatam; & commodiori typo recusam, eundem ubique ordinem secuti. Multa tamen studio omisimus quæ nullo modo vel raro in praxi erant ne nimium Pharmacopœorum officinæ expensis inutilibus gravarentur, multa autem quæ in usu quotidiano erant, & quæ in alterâ desiderabantur adjecimus, ut ubique uniformitas tam necessaria in dispensandis remediis hac in urbe conservaretur;

quod

quod & non leve hujus Editionis argumentum fuit. Paucis instructa remediis officina satisfacere potest, cùm nullus Medicorum sit in praxi versatus (si plura desideret) quin ex tempore & ad libitum quascumque Compositiones concinnare possit. Si quibus autem tyronibus ea nimis jejuna esse videatur, discant nos tantum dispensatorium proponere, & discant sub Magistris in arte peritis laborare; si quid prolixiùs voluerint adeant Autores gravissimos qui eâ de re ex professo scripserunt quos consulere poterunt. Nos contenti fuimus regulam seu normam ponere secundùm quam officinæ nostræ hac in urbe semper instructæ esse debent. Interim benevole Lector si quæ mendæ irrepserint quas evitare non est facile, eas ut benignè corrigere velis precamur. Vale & fruere.

J. M.

ÇARA

CARACTERES CHYMICI

[illegible]	✠	*Hora*	🝮
. destillatum	⊕	*Ignis*	△
	△	*Jupiter*	♃
Viride	⊕	*Luna*	☽
nbius	ҳҳ	*Mars*	♂
nen	O	*Massa*	⌀
lgama	ááá	*Mercurius*	☿
monium	♁	*Merc. præcipitatus*	☿
a	▽	*Merc. sublimatus*	☿
a fontis	▽Font.	*Nitrum*	⦶
a fortis	🜅	*Nox*	♀
a Regia	🜆	*Oleum*	◉
a Ros.	▽Ro.	*Plumbum*	♄
a	∴	*Præcipitare*	🝟
ntum	☽	*Pulvis, Pulverare*	🝫
nt. vivum	☿	*Retorta*	🝭
icum	oo	*Sal Armoniacum*	✳
igmentum	OO	*Sal Commune*	⊖
m	☉	*Sal Gemmæ*	♉
eum	B	*Sol*	☉
. Mariæ	MB	*Spiritus*	Sp.
Armena	AB	*Stannum*	♃
viva	♆	*Stimmi. Antim.*	♁
r	🜳	*Strat. sup. Strat.*	S.S.S.
mort.	☋	*Sublimare*	🝞
anth. vitriol	🜖	*Sulphur*	🜍
bs	♂	*Tartarum*	🜿
bis limatura	♂	*Terra*	🜨
s	♅	*Venus*	♀
baris	⊖	*Vinum*	V.
ul.	✠	*Vitriolum*	🜖
are	☊	*Urina*	⊡
	♁		

FON.

PONDERA MEDICA
ET
MENSURÆ.

um	*Significatur*		*per G. vel gr.*	
us,		℈ß.		*gr.x.*
pulus,		℈j.		*gr.xx.*
chma,		ʒj.		℈iij.
uncia,		℥ß.		ʒiiij.
a,	*per*	℥j.	*et pendet*	ʒviij.
ui uncia,		℥j.ß.		ʒxij.
ra,		*lib.ß.*		℥vj.
a,		*lib.j.*		℥xij.
ui libra,		*lib.j.ß.*		℥xviij.

nipulus est, quantùm manu comprehendi potest, et nificatur per M. j.

illus est, quantùm tribus digitis capi potest, et primitur per Pug. j.

t preterea Medicis familiares, aliæ abbreviationum tæ : utpotè

		numero.
		ana.i.cujusque vel singulorum.
		paria.
.æq.	*id est*	*partes æquales.*
		quantum sufficit.
.		*secundùm artem.*
l.		*Balneum Mariæ vel Maris.*

PHAR



PHARMACOPOEA BRUXELLENSIS.

CLASSIS PRIMA.

De Simplicibus Officinalibus.

Radices.

Cori *ſive* Calami aromatici officinarum.
Alcannæ.
Althææ.
Angelicæ.
Apii.
Ari.
Ariſtol. longæ.
rotundæ.
tenuis.
fabaceæ.
Aſari.
Aſparagi.
Biſtortæ.
Bryoniæ.
Cariophyllatæ.
Chelidoniæ.
Chinæ.
Cichorei.
Conſolidæ majoris.
Contra-yervæ.
Coſti.
Cucumeris aſinini.
Curcumæ.
Cyclaminis.
Cynogloſſi.
Cyperi longi.
rotundi.
Dictamni albi.
Doronici Romani.
Eryngii.
Ebuli.
Eſulæ utriuſque.
Filicis.

Fœniculi.
Galangæ.
Gentianæ.
Glycirrhyzæ.
Graminis.
Helenii.
Hellebori albi.
nigri.
Hermodactylorum.
Ialappæ.
Imper. *ſive* Oſtrutii.
Iridis Florentinæ.
Mandragoræ.
Mechoacannæ.
Meu.
Nymphææ.
Ononidis.
Oſmundæ regalis *ſive* Filicis paluſtris.
Pæoniæ maris.
Pentaphylli.
Petaſitidis.
Petroſelini.
Peucedani.
Phu *ſive* Valerianæ.
Polypodii quercini.
Pyrethri.
Rhabarbari.
Rhapontici.
Rubiæ tinctorum.
Ruſci.
Spica nardi Celtica.
Indica.
Saxifragiæ.
Scyllæ.
Scorzoneræ.
Scrophulariæ.
Tormentillæ.
Turbith.
Tuſſilaginis.
Vincetoxici.
Zarſæ parillæ.
Zedoariæ.
Zinziberis.

Fungi.

AGaricus.
Auriculæ Judæ.
Orbicularis. *Belgicè* Boviſt.

Cortices.

ARantiorum.
Capparum.
Caſſiæ ligneæ.
China Chinæ.
Cinnamomi.
Citriorum.
Fraxini.
Glandium calices.
Granatorum.
Guajaci.
Macis.
Tamariſci.
Winterani.

Ligna

Ligna.

ALoës.
Aſpalathum.
Guajacum.
Nephriticum.
Rhodium.
Santalum album.
citrinum.
rubrum.
Saſſaphras.
Viſci quercini.

Folia, & *Herbæ*.

ABrotani maris.
Abſynt vulgaris.
Romani
Adianthi albi,
Nigri.
Agrimoniæ.
Alchimillæ.
Althææ.
Anethi ſummitates.
Arthemiſiæ.
Betonicæ.
Botryos.
Calaminthæ.
Capilli Veneris,
Cardui benedicti.
Centaurei minoris ſummitates.
Ceterach.
Chamædrios.
Chamæpiteos.
Cuſcutæ cum floribus.
Dictamni cretici.
Epithymi.
Eryſimi.
Eupatorii cannab.
Euphraſiæ cum floribus.
Farfaræ *ſive* Tuſſilaginis.
Fumariæ. greÿ lecon
Hyperici ſummit.
Hyſſopi.
Lavendulæ.
Lauri.
Lupuli.
Majoranæ.
Malvæ.
Marrubii *ſive* Praſſy.
Matricariæ.
Meliſſæ.
Menthaſtri.
Menthæ criſpæ.
aquaticæ.
Mercurialis.
Nepethæ.
Ocymi ſ. Baſilici.

Origani cretici.
vulgaris.
Parietariæ.
Perſicariæ.
Phyllitidis.
Piloſellæ.
Pimpinellæ.
Polii montani.
Polygoni.
Polytrichi *ſeu* Trichomanis.
Pulegii.
Pulmonariæ.
Pyrolæ.
Quercus.
Roriſmarini.
Rutæ.
Rutæ murariæ.
Sabinæ.
Salviæ.
Saniculæ.
Satureiæ.
Scabioſæ.
Scolopendrii.
Scordii.
Senæ.
Serpilli.
Thymi cum flor.
Tuſſilaginis ſ. farfaræ.
Verbaſci.
Verbenæ.
Veronicæ.
Violariæ.
Virgæ aureæ.

Flores.

Balauſtia.
Betonicæ.
Bugloſſæ.
Borraginis.
Calendulæ.
Chamomeli vulg.
Romani.
Cariophylli *ſeu* Tunicæ.
Crocus.
Geniſtæ.
Lavendulæ.
Lilliorum convallium.
Malvæ arboreæ, hortenſis.
Meliloti.
Nymphææ albæ.
Pæoniæ.
Papaveris erratici.
Roriſmarini.
Roſarum rubrar.
Salviæ.
Sambuci.
Schænantum.
Stœchados.
Tiliæ.
Verbaſci.

Vio

Violarum.

Semina.

Acetosæ.
Agni casti.
Althææ.
Ammios.
Amomi.
Anethi.
Anisi.
Apii.
Aquilegiæ.
Asparagi.
Atriplicis.
Bardanæ.
Berberis.
Bombacis.
Cannabis.
Cardamomi minoris.
Carduibenedicti.
Carui.
Caulium.
Ciceres rubri.
Citri.
Citrulli.
Cnici *seu* Carthami.
Coriandri.
Cubebæ.
Cucumeris.
Cucurbitæ.
Cumini.
Cydoniorum.
Dactylorum ossa.
Dauci cretici.
Vulgaris.
Endiviæ.
Erucæ.
Fœniculi.
Fœnugræci.
Fumariæ.
Genistæ.
Grana paradisi.
Hordeum integrum.
mundatum.
perlatum.
Hyperici.
Hyoscyami albi.
Lactucæ.
Levistici.
Lini.
Lupini.
Malvæ.
Melonum.
Milii solis.
Napi *sive* Buniadis.
Nasturtii.
Nigellæ.
Nuclei cerasorum.
persicorum.
Ocymi.
Orobi.
Pæoniæ.
Papaveris albi.
nigri.
Petrosel. Vulgaris.
Macedon.

Plantaginis.
Portulacæ.
Psyllii.
Raphani.
Rusci.
Rutæ.
Santonici.
Saxifragiæ.
Scariolæ.
Seselios massiliensis.
Sileris montani.
Sinapi.
Sophiæ.
Staphidis agriæ.
Sumach.
Thlaspios.
Urticæ.

Fructus.

Alkekengi *seu* Halicacabi.
Amigdalæ amaræ.
dulces.
Baccæ juniperi.
lauri.
myrthi.
sambuci.
Berberis.
Capita papaveris.
Carpobalsamum.
Caryophylli.
Cassia fistularis.
Colocynthis.
Dactili.
Ficus.
Gallæ.
Glandes.
Jujubæ.
Kermes grana *sive* Coccus Baphica.
Myrobal. belliricæ.
Chebulæ.
Citrinæ.
Emblicæ.
Indæ.
Myrtilli.
Nuces cupressi.
Moschatæ.
Pistachiæ.
Vomicæ.
Passulæ majores.
minores.
Piper album.
longum.
nigrum.
Pruna.
Sebesten.
Siliquæ dulces.
Tamarindi.

Farinæ.

Amylum.
Fabarum.
Fœnugræci.
Hordei.
Lupinorum.

Radicum altheæ.
Confolidæ majoris.
Seminum lini.
Volatilis.

Succi liquidi.

AGreftæ *feu* omphacium.
Berberorum.
Cydoneorum.
Granatorum acid.
Limonum.

Succi condenfati, Gummi, & Refinæ.

Acacia vera.
Aloe Hepatica.
Succotrina.
Ammoniacum.
Affa fœtida.
Balfamum peruvianum.
Bdellium.
Benzoinum.
Bitumen Judaicum.
Caphura.
Colophonia.
Elaterium.
Eupatorii mefue fuccus.
Euphorbium.
Galbanum.
Ghittajemou *feu* gutta gamandra.
Glycyrrizæ fuccus.
Gummi arabicum.
Caranna.
Ceraforum.
Elemmi.
Juniperinũ.
Tacamahaca.
Hypociftidis fuccus.
Lacca.
Ladanum.
Liquid-ambar.
Manna.
Mafliche.
Myrrha.
Opium.
Opoponax.
Pix.
Refina Abietina.
Laricea.
Pini.
Therebinthina.
Saccharum album.
rubrum.
candum.
Sagapenum.
Sanguis draconis.
Sarcocolla.
Scammonium.

Styrax calamita.
liquida.
Succinum album.
Citrinum.
Tartarum vini albi.
Thus.
Tragacantha.

Animalia, eorum partes & excrementa.

ADeps anſeris.
canis.
cervi.
felis.
hominis.
Aſelli.
Axungia porci.
Bezoar occidentalis
orientalis.
Cancrorum fluviatilium oculi.
Cantharides.
Caſtoreum.
Cera alba.
flava.
Cornu cervi.
Cranium humanum
Ebur.
Hirci ſanguis præpar.
Ichthyocolla.
Mandibulæ lucii piſcis.
Mel.
Moſchus.
Mumia.
Os è corde cervi.
Sanguiſugæ.
Scincus.
Sepiæ os.
Sevum hircinum.
Sperma ceti.
Spodium ex ebore.
Ungula Alcis.
Unicornu.
Zibettum.

Mineralia Metalla, & Lapides.

ALabaſtrum.
Ærugo.
Æs uſtum.
Alumen rupeum.
plumeum.
uſtum.
Antimonium.
Argentũ foliaceum.
vivum.
Arſenicum.
Auri pigmentum.
Aurum foliaceum.
Bolus armenus.
albus.
vulgaris.

Borax

Borax.
Calx viva.
Cerussa.
Chalcitis.
Chalybs.
Chrysocolla.
Cinnabaris.
Crystallus.
Granatus.
Hyacinthus.
Lapis armenius.
calaminaris.
hæmatites.
judaicus.
lazuli.
Lithargyrus argenti.
auri.
Magnes.
Minium.
Osteocolla.
Plumbum ustum.
Pompholyx.
Rubinus.
Sal armoniacus.
Gemmæ.
Petræ *sive* Nitrum.
Sapphyrus.
Sardus.
Smaragdus.
Sulphur.
Terra lemnia.
Tuthia officinarum.
Vitriolum album.
Cypreum.
Viride.
Vitrum antimonii.

Marina.

AMbra grisea.
Corall. alb.
rubr.
Corallina.
Margaritæ.
Pumex.
Spongia.

De quibusdam nuncupationibus plura uno titulo comprehendentibus.

Quinque Radices Aperientes.

Apii.
Asparagi.
Fœniculi.

Pro

Petroſelini.
Ruſci.

Quatuor Herbæ Emollientes.

Althæa.
Beta, *vel* Parietaria.
Malva.
Violaria.

Quinque Herbæ Capillares.

Capillus Veneris.
Phillyris, *ſeu* Lingua cervina.
Polytrichum, *ſeu* Trichomanes.
Ruta muraria.
Scolopendrium, *ſeu* Ceterach.

Tres Flores Cordiales.

Borraginis.
Bugloſſæ.
Violarum.

Quatuor Semina Calida Majora.

Aniſi.
Cardamomi.
Cumini.
Fœniculi.

Quatuor Semina Calida Minora.

Ammios.
Apii.
Carui.
Dauci.

Quatuor Semina Frigida Majora.

Cucumeris.
Cucurbitæ.
Citrulli.
Melonum.

Quatuor Semina Frigida Minora.

Cichorei.
Endiviæ.
Lactucæ.
Portulacæ.

Quinque Lapidum Pretiosorum Fragmenta.

Granati.
Hyacinthi.
Sapphiri.
Sardi, *seu* Carneoli.
Smaragdi.

De quorundam simplicium Collectione.

RAdices evellendæ sunt, quandò nec nimis molles, nec nimis duræ, nec lignosæ.

Herbæ colligendæ sunt, quando folia magnitudine, colore, & odore vigent; idque cœlo sereno, & tempore meridiano.

Flores decerpendi sunt in vigore suæ maturitatis; non dehiscentes, aut decidui.

Flo-

Flores rosarum ante apertionem avellantur, quando conserva ex iis conficienda.

Fructus priusquam decerpantur, justam maturitatem habeant; nisi datâ operâ immaturi desiderentur, ut Mespila, Sorbi &c. Deinde exsiccandi sunt in aëre vel sole; & si opus sit, in clibano post panis exemtionem. Quod si unâ vice exsiccati non sint, postridie denuo immittantur.

Semina colligantur, quando sunt matura, & fructus, quibus includuntur, justam maturitatem cœperunt. Et in loco sicco, non calido, ad usum serventur.

Cortices sunt avellendi, quando arbores in pleno vigore sunt. Crassiores manu avellantur, si leviter adhæreant: sin tenacius ferro abscindantur. Tenues verò & membranosi, ut Sambuci, Fraxini, &c. cultello abradantur.



CLAS-



CLASSIS SECUNDA.

De Aquis Simplicibus, Compositis, Spiritibus, Tincturis, Acetis, & Decoctis.

Aquæ Simplices ſtillatitiæ.

Arthemiſiæ.
Borraginis.
Cardui benedicti.
Chicorei.
Fœniculi.
Florum Liliorum convallium.
Roſarum.
Sambuci.
Tiliæ.
Meliſſæ.
Menthæ.
Plantaginis.
Primulæ Veris.
Salviæ.
Scordii. &c.

Omnes hæ affusâ ſ.q. aquæ communis poſt debitam digeſtionem cum ſ. q. tartari factam. Per Veſicam deſtillantur.

Aquæ Ceraſorum nigrorum.
Cochleariæ.
Spermatis ranarum.

Per ſe ſ.a. in B.M. ex alembico vitreo deſtillari debent.

Aqua

Aqua Mellis.

℞. *Mellis q. s.*

Ut decima pars cucurbitæ repleatur cum vitreo Alembico & in B. bulliente destilletur aqua: cum autem guttæ incipiunt acescere vase arenæ imposito, igne aucto liquor secundus & tertius extrahatur.

DE AQUIS COMPOSITIS.

Aqua Anti-Scorbutica.

℞. *Rad. Raphani sylv.*
Herb. Cochleariæ.
Nasturtii àq. an. lib. I.
Beccab.
Trifolii aq. an. lib. ß.
Contusis affunde
Vini albi lib. VIII.
Spirit. Vini lib. II.
Et sine præviâ fermentatione destill. s. a. ad lib. VII.

Aqua Catharralis.

℞. *Florum Salviæ.*
Rorismar.
Lavendulæ recent. sed modice siccat.
Garyophill.
Nucis mosch.
Cinnam. acuti an. Unc. II.
Gran. Paradisi.
Macis.
Rad. Zedoariæ.
Sem. Coriandri.

Piperis

Piperis longi.
nigri an. Unc. I.
Fol. Ruthæ.
Absinthy recent. sed modice sicc. an. dr. II.
Pomum aurantium incisum. unum
contusis contundendis infunde per plures dies in
Vini Rhenani lib. VIII.
Vini Hispan. lib. IV.
& per refrigeratorium destillentur.

Aqua Cinnamomi.

℞. *Cinnamomi electi & contusi lib. ß.*
Vini albi generosi lib. IV.
Tartari crudi Unc. II.
Macerentur per dies aliquot in loco tepido postea additâ.
Aquæ Melissæ lib. I.
destill. f. a. in arenâ.

Aqua Embryonum.

℞. *Nucis mosch. Unc. III. ß.*
Macis Unc. I. ß.
Garyophill.
Cinnam. acuti.
Zinziberis.
Cubebarum.
Gran. Paradisi.
Zedoariæ an. Unc. II.
Galangæ drach. VI.
Croci orient. Unc. ß.
Flor. Tunicæ.
Tiliæ an. recent. lib. I.

Herb.

Herb. Salviæ cum flor.
Carui.
Fœniculi.
Verbenæ.
Flor. Lavendulæ an. recent. Unc. III.
Rad. Pæoniæ maris.
Sem. ejuſdem.
Viſci quercini veri an. Unc. II.
Inciſa & contuſa craſſiuſcule infunde in
Vini Canarini lib. XII.
Aquæ Lilior. convall. ſine additione aquæ.
Simpl. in B. M. deſtillatæ.
Spirit. Fragrorum an. lib. I. ß.
Aquæ Salviæ.
Fœniculi ſine addit. aq. ſimpl. deſtill
an. lib. I.
Stent in infuſione loco tepido per menſem.
Poſtea deſtill. in B. M. ad medias.

Aqua Epileptica.

℞. *Florum Lilior. convall. m. X.*
Tiliæ m. IV.
Vini Hiſpan. lib. VIII.
Fiat infuſio per dies aliquot mox deſtill. in balneo quo uſque flores in fundo cucurbitæ fere aridi relinquantur deinde
℞. *Cinnam. acuti drach. VI.*
Nucis moſch. Unc. ß.
Piperis longi.
Cubeb. an. drach II.
Flor. Lavendulæ Unc. I. ß.
Roriſmar.
Stæchad. an. drach. VI.
Viſci quercini veri.

Rad.

Rad. Pæoniæ.
Dictamni nost. an. Unc. ß.

Omnia crassiuscule contrita rursus in superiori Vino per dies octo macerentur postmodum destill. s. a. ad medias.

Aqua Hysterica.

℞. *Rad. Bryoniæ Siccat.*
Baccar. Sambuci matur. lento furni calore exsicc. & à stipit. mundat. an. Unc. II.
Fol. Arthem.
Dictam. Cret.
Matricariæ.
Nepetæ.
Ocymi.
Pulegij.
Ruthæ.
Sabinæ an. Unc. ß.
Cortic. aurant. exter. siccat. Unc. I. ß.
Myrrhæ.
Castorei an. drach. III.
Croci drach. I.

Pulverisata macerent. per octiduum in *Spirit. Vini dephlegmati lib. IV.*
Deinde colentur per setaceum densissimum.

Aqua Prophylactica.

℞. *Rad. Angelicæ.*
Zedoar. an. Unc. I.
Petasitid. Unc. II.
Fol. Rutæ Hortens. Unc. IV.
Melissæ.
Scabiosæ.

Flor. Calendulæ an. Unc. II.
Nucum Jugland. immatur. concis. lib. II.
Pomor. Citrior. concis. recent. lib. I.
Contusis affunde
Aceti Vini destillati lib. XII.
Digerantur per noctem mane destill. igne cinerum lento penè ad siccitatem idque sine ustione.

Aqua Theriacalis Simplex.

℞. *Theriacæ recent. Unc. IV.*
Spirit. Vini dephlegmati Unc. XX.
Digerantur simul per tres dies in B.M. dein clarum à spisso per decantationem separa.

Aqua Vitæ compos.

℞. *Cinnamomi acuti drach. VI.*
Nucis mosc. Unc. ß.
Garyophill.
Rad. Zedoariæ
Zinziberis
Cubebar.
Cardamom. minor
Ligni Santal. rubri
Spicæ nardi
Stæchad. Arab. an drach. I.
Rad. Galang. drach. ß.
Fol. Rorismar.
Majoranæ siccat. an. scrup. II.
Cortic. Aurant. siccat. drach. II. ß.
Flor. Rosar. rubr.
Lavendulæ
Anthos an. drach. III.
Contusis contund. affunde

Spirit.

Spirit. Vini dephlegmati lib. IV.

Digere leni calore per dies aliquot & postea liquor decantetur.

Aqua Vitæ Aulica.

℞. *Rad. Enulæ Camp. Unc. III.*
Galangæ
Anisorum an. Unc. I. ß.
Croci drach. III.
Calaminthæ m. II. ß.
Pulegij
Dictamni Cretici
Majoranæ
Arthemisiæ
Agrimoniæ an. m. I. ß.
Garyophillorum drach. III.

Incidenda incidantur & terenda terantur deinde affunde

Spiritus Vini optimi lib. VI.

Destill. per allembicum Vitreum destillatis adde

Aquæ Melissæ Unc. IX.
Cinnamomi Unc. VII.
Sacchari albi lib. ß.

In vase optime clauso servetur ad usum.

Spiritus Carminativus.

℞. *Rad. Angelicæ drach. I.*
Imperat.
Galangæ an. drach. I. ß.
Fol. Rorismar.
Majoranæ
Ruthæ Hortensis
Basiliconis

Summit. Centaurii minoris an. m. ß.
Baccar. Lauri drach. III.
Semin. Angelicæ.
Levistici
Anisi an. Unc. ß.
Zinziberis
Nucis mosch.
Maceris an. drach. I. ß.
Cinnam. acuti drach VI.
Garyophill.
Corticum Aurant. siccat. an. drach. I.
Spirit. Vini Unc. XXXX.

Digerantur simul & postea f. a. destillentur

Aqua seu Elixir antifebrile.

℞. *Garyophill. Unc. IV.*
Mithridatii Unc. III.
Spiritûs Vini lib. VI.

Digerantur simul calide per dies aliquot postea liquor filtretur cui adde
Camphoræ Unc. II. ß.
Olei Juniperi drach. VI.
Sal. Volatil. C. C. Unc. ß.

Et circulando in calore leni fiat exacta mixtio & dissolutio.

Spiritus Aromaticus Oleosus
Seu
Sal Volatile Oleosum.

℞. *Foliorum Majoranæ*
Menthæ
Salviæ siccat. an. drach. VI.
Florum Lavendulæ drach. III.
Cortic. exterior Citri
Aurant. an. Unc. II.

Cinnamomi acuti Unc. I. ß.
Nucis moschatæ
Maceris an. drach. VI.
Garyophillor. Unc. ß.
Sem. Cardamomi min.
Carui an. drach. II.
Salis Tartari
Armoniaci an. Unc. IV.
Spiritus Vini lib. IV.

F. infusio per dies aliquot & destillentur ex arenâ f. a.

Spiritus Vini Camphoratus.

℞. *Spiritus Vini dephlegmati lib. I.*
Camphoræ Unc. I.

Misce simul.

Spiritus Vini Rectificatus.

℞. *Spiritus Vini q. v.*

Destilletur per Alemb. in B. M. quod toties repetatur donec pulverem tormentarium accendere possit.

Spiritus Ardentes.

Cochleariæ
Menthæ
Melissæ
Baccar. Sambuci
Juniperi
Cerasor. nigror.
Fragorum &c.

℞. *Fol. aut Fructuum supradict. q. v.*

Ferment. & destill. f. a. quæ postea debite rectific.

DE TINCTURIS.

Tinctura Croci.

℞. *Croci Unc. I.*
Spiritus Vini rectif. lib. ß.
Extrahatur ſ. a. Tinctura.

Tinctura Cinnamomi.

℞. *Cinnamomi optimi Unc. II.*
Spiritus Vini rectif. Unc. VIII.
Extrah. ſ. a. Tinctura.

Tinctura Caſtorei.

℞. *Caſtorei pulveris Unc. I.*
Spiritus Vini rectific. Unc. VIII.
Salis Tartari drach. I.
Digerantur per ſex dies & demum filtrando clarum à ſpiſſo ſepara.

Tinctura Gummi Laccæ.

℞. *Gummi Laccæ Unc. ß.*
Aluminis uſti drach. I.
Spiritus Cochleariæ ultimo extillantis Unc. VIII.
Phialæ arcte incluſa digerantur in arenâ donec tinctura ſatis rubicunda appareat quæ leniter effundatur.

Tinctura Opii.

Seu

Laudanum liquidum Tartariſatum.

℞. *Opii Thebaici Unc. I.*
Croci drach. II.
Cinnamomi

Ga-

Garyophill.
Macis
Nucis moſchatæ an drach. ß.
Salis Tartari drach. I.
Spiritus Vini rectificati lib. I.

Digerantur per dies aliquot poſtea liquor filtretur & ad dimidium exhaletur.

Tinctura Salis Tartari.

℞. *Salis Tartaris Unc. VI.*

Calcinetur violento igne donec ceruleus evadat quod fit ſpatio trium vel quatuor horarum. Ferè refrigeratum crucibulum frangatur. Maſſa exempta teratur. Huic pulveri adhuc calenti ſuperfunde alcohol Vini ad ſupereminentiam duorum vel trium digitorum digerantur ſimul donec colore rubro tinctus appareat ſpiritus quem effunde & ſepara.

Tinctura Succini.

℞. *Succini flavi & in pollinem redacti Unc. IV*
Spirit. Vini rectific. lib. I.

Digerantur ſimul per dies aliquot ad Succini ſolutionem deinde decant. filtret. & tertiam partem. in B. M. abſtrahatur.

Elixir proprietatis.

℞. *Myrrhæ electæ.*
Aloes lucidæ
Croci an. Unc. I.

Affunde liquorem nitri fixi ad madefactionem digerantur ſimul per dies aliquot in B. M. poſtea adde

Alcohol Vini Unc. X.

Tincturam per dies duodecim digerendo & circulando extrahe quam postea decanta.

Præparatur etiam alio modo hoc Elixir humectando species supradictas spiritu Vini alcoholisato & addendo spiritûs sulphuris per campanam q. s. procedendo ut supra.

DE ACETIS.

Acetum Calendulæ
Rosarum rubrarum
Sambuci &c.

Fiunt eodem modo

℞. *Florum Siccat. lib. ß.*
Aceti Vini acerrimi lib. IV.

Insolentur æstivis caloribus in vase vitreo optime clauso dein abjectis floribus Acetum reponatur.

Acetum Stillatitium.

℞. *Aceti vini acerrimi q. v.*

Destilletur ex Cucurbitâ vitreâ in B. M. vel cineribus lenissimo calore, primò ascendit phlegma, ferè ad quartam partem liquoris, quod extillavisse cognosces acido odore & sapore. Tum muta recipiens, & collige Acetum destillatum, continua destillationem, donec spiritus omnes ascenderint.

Acetum Scylliticum.

℞. *Tunicarum Scyllæ leviter exsiccatæ Unc. IV*
Aceti Vini lib. IV.

Misce

Miſce in vaſe vitreo benè clauſo & inſolentur æſtivis caloribus.

Acetum Theriacale.

℞. *Rad. Petaſitidis Unc. III.*
Scorzoneræ,
Angelicæ,
Zedoariæ,
Succiſæ an. Unc. II.
Herb. Petroſelini Macedonici,
Scordii,
Galegæ,
Ruthæ hortenſis ana Unc. I. ß.
Baccarum Juniperi,
Herbæ Paridis ana Unc. I.
Cortic. Citri exteriorum Unc. III.
Flor. Calendulæ ſiccatorum Unc. ß.
Croci Orientalis drach. II.
Mirrhæ electæ,
Cinnamomi optimi ana Unc. II.
Macis Unc. I. ß.
Theriacæ Andromachi Unc. II.
Inciſa & contuſa immittantur vaſi vitreo; quibus ſuper affunde
Aceti vini acerrimi lib. X.
Et vaſe rectè obturato, ſerventur ad uſum.

Acetis ſubjungi poſſunt, *Oxycratum*, ſeu *Poſca*, & *Oxyrhodinum*.

Oxycratum conſtat parte unâ aceti, & ſex aquæ.

Oxyrhodinum paratur ex parte unâ Aceti roſati, & tribus partibus Olei roſati.

DE

DE DECOCTIS.

Decoctum Hordei.

℞. *Hordei mundati Unc. II.*
Aquæ communis lib. XII.
Coque ad tertiæ partis consumptionem.

Cremor Hordei.

℞. *Hordei perlati Unc. II.*
Aquæ communis q. s.

Decoque igne lento, donec fervescant, tum abjectâ priori aquâ, nova addatur, coquendo per quatuor vel quinque horas: deinde trajiciatur per setaceum, trajecto adde sacchari albi, & aquæ Rosarum ana quantùm satis.

Hordeatum Amygdalinum.

℞. *Decocti Hordei Unc. X.*
Amygdalarum dulcium per aquam ferventem mundatarum Unc. ß.

Pistentur in mortario marmoreo, & addita sacchari albi & aquæ Rosarum quantitate sufficiente, f. Hordeatum Amygdalinum.

Simili modo fiunt emulsiones ex seminibus frigidis majoribus, f. a. mundatis.

Ptisana Communis.

℞. *Hordei integri Unc. I. ß.*
Aquæ communis lib. VIII.
Coque ad medias sub finem adde
Liquiritiæ rasæ drach. IV.

Ani-

Aniſorum drach. I.

Fiet Paſſulata ſi inter coquendum addatur paſſularum mundatarum Unc I. *ß.*

Decoctum Cordiale, Medecinæ.

℞. *Hordei mundati pug. I.*
Pruna Damaſcena Num. IV.
Uvarum paſſarum exacinatarum Unc. ß.
Glycyrrhizæ raſæ drach. I. ß.
Flor. Borraginis,
Bugloſſi,
Violarum ana pug. I.
Aniſorum drach. I.
Aquæ fontis lib. III.

Decoque ſ. a. ad tertiæ partis conſumptionem, colatura ſervetur ad uſum.

Decoctum ſolutivum.

℞. *Superioris colaturæ lib. I.*
Fol. Sennæ mundatorum drach. VI.
Aniſorum contuſorum drach. II.

Effervefcant leviter, & ſine colatura ſerventur ad uſum.

Decoctum Pectorale.

℞. *Hordei mundati Unc. ß.*
Uvarum paſſarum enucleatarum drac. VI.
Sebeſten,
Jujubas ana Num. X.
Dactylos Num. VI.
Caricas pingues Num. IV.
Rutæ murariæ,
Scabioſæ,
Tuſſilaginis ana m. ß.

Hyſſopi

Hyssopi pug. I.
Glycyrrhizæ rasæ drach. II.

Coquantur in lib. VIII. aquæ fontis, ad medias.

Decoctum Clysteris Emolliens.

℞. *Fol. Malvæ,*
Althææ,
Violariæ,
Betæ,
Mercurialis an. m. I.

Coquantur s. a. in sufficienti quantitate aquæ communis ad libras duas, colatura servetur ad usum, herbæ sint semper recentes, si fieri possit.

Decoctum Carminativum.

℞. *Herb. Origani,*
Pulegii,
Summitatum Thymi an. m. ß.
Seminum Anisi,
Carui,
Cumini,
Fœniculi an. drach. III.
Flor. Chamomæli,
Summitatum Anethi an. m. ß.
Uvarum passarum exacinatarum Unc. I.

Bulliant leviter in aquæ lib. III. colatura servetur usui.

Decoctum Nephriticum.

℞. *Rad. Eryngii,*
Ononidis an. Unc. ß.

Hordei

Hordei mundati Unc. II.
Cicerum rubrorum Unc. III.
Caricas pingues Num. IX.
Sevesten Num. VII.
Glycyrrhizæ rasæ drach. VI.
Semin. Malvæ,
Althææ an. drach. III.
Quatuor frigidorum majorum an. drac. II.

Coquantur in aquæ fontis libris decem, ad libras sex.

Decoctum Vulnerale.

℞. *Rad. Consolidæ majoris siccat.*
Alkannæ. i. Anchusæ,
Tussilaginis,
Rubiæ tinctorum an. drach. III.
Fol. Melissæ,
Millefolii,
Saniculæ,
Pyrolæ,
Betonicæ,
Agrimoniæ,
Bugulæ,
Alchimillæ,
Veronicæ an. m. ß.
Oculorum Cancri contusorum Unc. II.
Spermatis cæti drach. I.

Bulliant in sufficienti quantitate aquæ ad libras sex, addendo sub finem vini Rhenani libras duas.

CLASSIS TERTIA.

De Syrupis, Mellitis & Looch.

Syrupus hederæ terreſtris.

℞. *Succi hederæ terreſtris depurati lib. VI.*
Sacchari albiſſimi lib. IV.

Clarific. album. Ovor. & f. ſ. a. Syrupus.

Eodem modo fiunt Syrupi.

Ex Succis { *Borraginis*, *Chicorei*, *Endiviæ*, *Rubi Idæi*, *Scabioſæ*, *Tuſſilaginis &c.*

Similiter ex Succis non acidis.

Syrupus ex ſucco Limonum.

℞. *Succi Limonum recent. Expreſſ. & per ſubſidentiam depurati lib. I.*
Sacch. Albiſſ. clarific. & ad conſiſtent. cocti lib. II.

Miſceantur ſ. a. in vaſe fictili & f. Syrupus.

Simili ferè modo conficiuntur Syrupi.

Ex Succis { *Agreſtæ*, *Aurantiorum*, *Berberis*. *Granator. acidor.* *dulcium*, *Ribeſiorum &c.*

Et

Et ex reliquis ſuccis Acidis clarific. alios plus alias minus, alios non coquendo pro naturâ acredinis quod artifici relinquimus.

Syrupus de Abſynthio.

℞. *Abſynthii vulg. lib. ß.*
Roſar. rubr. Unc. II.
Spicæ Indicæ drach. III.
Vini veteris optimi.
Succi Cydoniorum an. lib. III. ß.

Inciſis incidend. immitantur cucurbitæ quibus affund. vinum & ſuccus cydon. fiat per horas 24. in arenâ maceratio tum igne aucto ac appoſito capitello f. deſtill. liquoris ſpirituoſi ad Unc. X. circiter, qui aſſervetur. Refrigeratâ Cucurbitâ ſpecies in fundo relictæ exprimantur. Expreſſum album. ovi clarific. cum
Sacchari albi lib. II.
Coq. ad Syrupi conſiſt. craſſior. cui demùm ſola diſſolutione admiſce liquorem ſpirituoſiorem reſervatum & f. ſ. a. Syrupus.

Syrupus de Althæâ.

℞. *Rad. Althææ recentium Unc. II.*
Cicerum rubrorum Unc. I.
Rad. Graminis,
Aſparagi,
Liquiritiæ,
Paſſularum exacinatarum an. Unc. ß.
Cymarum Althææ,
Malvæ,
Helxines, ſive Parietariæ,
Pimpinellæ minoris,

Plan-

Plantaginis majoris,
Polytrici,
Rutæ murariæ an. manip. I.
Quatuor seminum frigidorum major.
frigid. minor. an. drach. III.

Coquantur s. a. in aquæ communis lib. IX. ad remanentiam lib. VI. colaturæ clarificatæ adde

Sacchari albissimi lib. IV.

Fiat ex arte Syrupus.

Syrupus de Arthemisiâ.

℞. *Rad. Fœniculi,*
Helenii,
Iridis,
Levistici,
Pæoniæ,
Rubiæ tinct. an. Unc. ß.
Herb. Arthemisiæ m. II.
Betonicæ,
Calaminthæ,
Chamædrios,
Chamepiteos,
Hyssopi,
Hyperici,
Majoranæ,
Matricariæ,
Melissæ,
Nepetæ,
Origani,
Prassii,
Pulegii,
Sabinæ an. m. I.
Sem. Anisi,

Dauci

Dauci,
Fœniculi,
Nigellæ,
Ocymi,
Petroſelini,
Rutæ an. drach. III.
Cinnamomi Unc. I.
Spicæ Indicæ drach. III

Contund. & incid. groſſo modo dein macer. per duos dies in *ſ. q. Hydromelitis vinoſi dilutioris* poſtea per B. M. ſeparetur aqua ſpirituoſa quâ ſeorſim exceptâ reliquiæ ulterius coquantur ſ. a. colatura cum

Sacchari lib. V.

percoquantur in Syrupum craſſum ut poſtea permiſceri queat aquæ ſpirituoſæ aſſervatæ.

Syrupus Capillorum Veneris.

℞. *Capillorum Veneris, vel ejus defectu Rutæ murariæ m. III.*
Polytrici aurei, vel ejus loco Trichomanes,
Saxifragiæ,
Betonicæ,
Pimpinellæ,
Aſplenii an. m. II.

Coquantur ex aquæ fontis lib. VIII. donec ad quinque redeant, in expreſſo clarificato diſſolve.

Sacchari albiſſimi lib. III. ß.
Mellis optimi depurati lib. ß.

Fiat ſ. a. Syrupus.

Notandum hîc, ut etiam ubicumque requiritur Ruta muraria, vel Polytricum,

 herbam

herbam ſemper recentem intelligi, aliàs ea
non præſtat, quæ intendit Medicus.

Syrupus de Chicoreo compoſitus.

℞. *Hordei integri,*
Rad. Apii,
Fœniculi,
Aſparagi an. Unc. II.
Herb. Cichorii m. III.
Endiviæ domeſticæ,
ſilveſtris,
Taraxaci an. m. II.
Cicerbitæ,
Fumariæ,
Polytrici,
Aſplenii,
Salviæ vitæ,
Summitatum Lupulorum an. m. I.
Fructuum recentium Alkekengi,
Radicum Glycyrrhizæ an. drach. VI.
Aquæ fontis lib. XII.
Coquantur ordine debito ad lib. VIII. i
colatura clarificata diſſolve
Sacchari albiſſimi lib. VI.
Percoquantur ſ. a. in Syrupum.

Syrupus de Cortice citri.

℞. *Cortic. exterior citri recent. Unc. X.*
Gran. Kermes drach. II.
Aq. fontis lib. VI.
Infunde per noctem & poſtea per B. M
ſeparetur aqua ſpirituoſa ad Unc. X. q
ſeorſim exceptâ reliquiæ ulterius coqua
tur ad lib. III. colatura cum

Sa

Sacchari albissimi lib. II. clarificata.

Coque in Syrupum crassum cui postea admisceatur aqua spirituosa.

Syrupus de Erysimo.

℞. *Fol. Erysimi recent. m. VI.*
Rad. Helenii,
Tussilag.
Liquirit.
Passular. exacin.
Hordei integri an. Unc. II.
Herb. Borrag.
Chicorei,
Capill. Ven. an. m. I. ß.
Flor. Trium Cordial.
Anthos,
Stoechados an. m. ß.
Sem. Anisi drach VI.

Incisa & contusa coque s. a. ex aquæ lib. VIII. ad medias colat. Express. adde

Succi Erysimi clarific. Unc. VIII.
Sacch. albi lib. III.
Mellis despumati lib. I.

F. s. a. Syrupus.

Syrupus de Hysopo.

℞. *Aquæ fontanæ lib. VIII.*
Hordei mundati Unc. ß.

Coquantur circiter per mediam horam, deinde injiciantur

Rad. Apii,
Petroselini,
Foeniculi,
Glycyrrhizæ incisarum an. drach. X.

Jujubarum,
Sebesten an. Paria XV.
Passularum mundatarum Unc. I. ß.
Caric. ping.
Dactyl. ping. an. N. X.
Semin. Malvæ,
Cydoniorum,
Gummi Tragacanthi linteo raro inclusorum an. drach. III.
Hysopi mediocriter siccæ drach. X.
Capillorum Veneris drach. VI.

Elixentur simul, sic tamen, ut quadrantis horæ intervallo radices fructus, fructus semina, semina herbas præcedant: tandem quinque libris aquæ desideratis aut absumptis, adde reliquis tribus colatis priùs & clarificatis

Sacchari albissimi lib. II. ß.

Et percoque in Syrupum, ut artis est.

Syrupus de Menthâ.

℞. *Succi Cydonior.*
Vini albi an. lib. I. ß.
Menthæ siccæ lib. ß.
Rosar. rubr. Unc. I. ß.
Nucis moschatæ drach. III.
Cinnamomi Unc. ß.
Mastich. drach. II.

Infund & diger. ex arenâ in cucurb. terreâ vel vitrea deinde destill. per alemb. Vitreum aqua spirituosa ad Unc. X. quæ seorsim asservetur deinde post alteram ebullitionem colatura Exprim. quæ decantatâ cum

Sacch.

Sacch. lib. III.

Coq. in Syrup. craſſiorem cui demùm admiſce aquam ſpirituoſ. aſſervatam & ſola diſſolutione f. Syrupus.

Syrupus Myrtinus.

℞. *Baccarum Myrti Unc. II. ß.*
Roſarum rubrarum,
Santali albi,
rubri,
Sumach,
Balauſtiorum,
Berberorum an. drach. XV.
Meſpilorum immaturorum lib. ß.

Coquantur in aquæ fontis lib. VIII. ad dimidias, colentur, & cum
Sacchari albiſſimi lib. III.
Et in fine
Succorum Granatorum,
Cydoniorum depuratorum an. lib. ß.
F. ſ. a. Syrupus.

Syrupus Papaveris albi.

℞. *Capitum Papaveris albi recentium & maturorum lib. I.*

Infunde per diem & noctem in aquæ pluvialis lib. IV. Coquantur, donec macreſcant & fortiter exprimantur, expreſſo adde
Sacchari albiſſimi,
Penidiorum an. lib. I.

Coque lento igne in Syrupum, cavendo nicè ne mucillagineum evadat decoctum, quale *Capita Papaveris* etiam præbêre ſolent, ſi diu coquantur.

Syrupus Papaveris Erratici.

℞. *Florum Papaveris Erratici lib. ß.*

Infunde per noctem in aquæ fontis calentis lib. II. infusio tertio reiteretur, tum adde

Sacch. albissimi cum dicta infus. clarif. lib. I. ß.

Coquantur in Syrupum s. a. Eodem modo fit Syrupus florum *Chamomillæ*, tum etiam ex partibus albissimis florum *Nymphææ*, repetitis ut dictum est, trinis infusionibus.

Syrupus de Pæonia.

℞. *Rad. Pæoniæ maris Unc. II.*
Nucleorum seminis ejusdem,
Visci quercini veri an. Unc. I.
Herb. Betonicæ,
Primulæ veris,
Verbenæ an. m. I.
Flor. Rorismarini,
Stœchados,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Tiliæ recentium an. pug. I.

Decoquantur s. a. in aquæ fontis lib. VI. ad dimidias colaturæ fortiter expressæ adde

Sacchari albissimi lib. II.

Fiat ex arte Syrupus.

Syrupus de quinque Radicibus.

℞. *Rad. Apii,*
Fœniculi,
Petroselini,

Rusci,

Rusci,
Asparagi an. Unc. II.
Aquæ fontis lib. VI.

Elixando evaporet pars tertia, ex reliquo cum

Sacchari albissimi lib. III.
Aceti vini albi Unc. VIII.

Sub finem affusis, conficiatur Syrupus s. a.

Syrupus de Rosis siccis.

℞. *Rosarum rubrarum siccatarum lib. I.*

Infundantur in aquæ calentis puræ lib. X. horis 24. infusionem hanc (reassumptis semper novis Rosis) triplicando: tandem in expressione dilue

Sacchari albissimi lib. IV.

Coque ex arte in Syrupum.

Syrupus de Scordio.

℞. *Rad. Scorzoneræ recentium Unc. II. ß.*
Fol. Scordii recentium m. IV.
Ulmariæ recentium m. II. ß.
Sonchi levis,
Endiviæ,
Borraginis,
Acetosæ,
Scorzoneræ,
Flor. Nymphææ recentium an. m. I.
Cordialium an. pug. I.

Coquantur s. a. in aquæ Hordei integri lib. VI. ad mediæ partis consumptionem, colaturæ clarificatæ adde

Sacchari albissimi lib. II.

Coquantur in Syrupum s. a.

Syrupus de Symphito.

℞. *Rad. & Cymarum Symphiti majoris & minoris an. m. VI.*
Fol. Betonicæ,
Plantaginis,
Pimpinellæ,
Polygoni,
Scabiosæ,
Tussilaginis,
Rosarum rubrarum recent. an. m. IV.

Contusis omnibus recentibus adde aq. comm. lib. IV. colat. fortiter expressa clarific. cum
Sacchari albissimi lib. IV.
Coquatur in Syrupum.

Syrupus de Stœchade.

℞. *Flor. Stœchados Arabicæ Unc. IV.*
Herb. Betonicæ,
Thymi,
Calaminthæ,
Origani an. Unc. I. ß.
Salviæ,
Flor. Rorismar.
Pæoniæ,
Ruthæ,
Cinnamom.
Zinziberis,
Calami Aromat. an. drach. III.

Macerentur simul in s. q. Hydromel. per 24. horas dein destillationi ut supra committ. ut aqua Spirituosa extrahatur quâ seorsim excepta reliquiæ ulteriùs coquantur & cum

Sacchari & Mellis optimi an. lib. II.

F. Syrupus craſſus ut poſtea permiſceri queat aquæ Spirituoſæ.

Syrupus Violaceus.

℞. *Flor. Violarum à pediculis herbaceis mundatorum lib. I.*

Aquæ fontis ferventis lib. II.

Arctè claude in olla nova vitreata per integrum diem, deinde exprime prælo, in expreſſi lib. II. diſſolve ad Balnei calorem.

Sacchari albiſſimi lib. IV. & Unc. III.

Spuma emergens auferatur, fiatque ſine coctione Syrupus ſ. a.

Nota, ſi cum Melle quis Syrupum ex præſcripto Medici parare cupiat, is eligat album odoratiſſimum, quale Hiſpanum eſt, aut quod Virgineum vocant: rejiciat verò vulgare illud flatuoſum.

Syrupus de Chicoreo cum Rheo.

℞. *Rhabarb. inciſi Unc. I.*

Cinnamomi,

Schœnanti an. drach. ß.

Infunde calide in aquæ Chicorei deſtill. Unc. IX. colat. expreſſa aſſervetur tum reſiduo affund.

Decocti Syrupi de Chicor. compoſ. lib. I. ß.

Coq. unâ aut alterâ ebullit. colat. Expreſſa cum

Sacch. lib. I. clarific.

Percoq. in Syrup. craſſior. cui admiſce ſuperiorem Tincturam aſſervatam & ſolâ diſſolut. f. ſ. a. Syrupus.

Syru-

Syrupus Florum Perficorum.

℞. *Florum Perficorum recentium lib. I.*

Macerentur per 24. horas in aquæ calentis lib. III. expreffo poftmodùm & colato liquori parem florum recentium quantitatem infunde, idque quinies iteretur: poftremæ colaturæ accipe lib. III.

Sacchari albiffimi lib. II. ß.

F. f. a. Syrupus.

Syrupus de Polipodio.

℞. *Rad. Polipodii quercini recentis lib. I.*

Incidatur infundaturque horis 24. in lib IV. aquæ fontis: deinde bulliant ad confumptionem quartæ partis, ac in fine adde

Rad. Acori veri Unc. I.
Sem. Fœniculi drach. III.

Iterùm leniter bulliant, ac decocto hujus colato adde.

Infufionis Rofarum folutivæ lib. I. ß.
Succorum depuratorum Borraginis,
Fumariæ,
Lupuli an. Unc. VI.

In his fuccis & liquoribus coque

Myrobalanorum Citrinorum,
Chebulorum,
Indorum an. Unc. I. ß.
Paffularum minorum Unc. III.

Bulliant fimul ad confumptionem tertiæ partis, in fine addendo

Fol. Sennæ Orientalis mundatorum Unc. VI
Sem. Fœniculi dulcis Unc. I.

Infun-

Infunde per noctem, postmodùm exprimantur, & colentur, ac colatura cum
Sacchari lib. III.
Coquatur in Syrupum, usui reponendum.

Syrupus de Rhamno Cathartico.

℞. *Baccarum, fruticis spinæ Cervinæ in principio Octobris collectarum quantitatem sufficientem.*

Contundantur in pilâ lapideâ, deindè exprimendo colentur: succus expressus coquatur lento igne ad quartæ partis consumptionem, tum iterum coletur.

℞. *Hujus Colati lib. II.*
Sacchari albissimi Unc. XVI.

Coquantur simul in Syrupi consistentiam cui tandem admisce elæosaccharum

Sacch. pulveris Unc. ß.
Ol. Stillat. Anisi,
Caryophill.
Nucis Moschatæ,
Cinnamomi an. gutt. VI.

Misce f. Syrupus.

Syrupus Regis solutivus.

℞. *Fol. Sennæ mundatorum Unc. II.*
Aquæ Fœniculi lib. II.
Infunde per 24. horas, tum adde
Infusionis Violarum ex quinque infusionibus,
Infus. Rosar. ex novem infus. an. Unc. VIII.
Sacchari albissimi lib. II.
Misce, f. f. a. Syrupus.

Syru-

Syrupus Rosarum solutivus.

℞. *Rosarum pallidarum recentium, ut decet, mundatarum lib. III.*
Aquæ fontis lib. XII.

Infundantur per diem naturalem deindè rursum calefactæ exprimantur, iterùm in eadem aqua par florum quantitas infundatur & exprimatur, & hoc nonies, ut antè dictum est, reïteretur tum

℞. *Colaturæ præscriptæ partes sex.*
Sacchari albissimi partes quatuor.

Clarificentur, & coquantur in Syrupum.

DE MELLITIS.

Mellis despumatio.

℞. *Mellis optimi lib. IV.*
Aquæ fontis lib. II.

Coque s. a. semper despumando ad aquæ consumptionem.

Hydromel simplex.

℞. *Mellis optimi lib. I.*
Aquæ fontis lib. VIII

Decoquantur simul benè despumando, dum ovum recens impositum supernatare queat.

Oxymel simplex.

℞. *Mellis optimi lib. IV.*
Aquæ fontis lib. I.

Coquantur simul in vase fictili, semper despumando ad aquæ consumptionem, tum adde

Aceti acerrimi lib. II.

Coque f. a. donec Syrupi liquidioris consistentiam acquirat.

Oxymel Scylliticum.

℞. *Mellis despumati ad consist. cocti lib. III.*
Aceti Scyllitici lib. II.
Misce sine ullâ coctione ad usum.

Oxymel Marrubiatum.

℞. *Decocti Marrub. albi.*
Mellis despum. an. lib. I.
Coque in Syrup. crassior. adde
Aceti vini optimi lib. ß.

Mel Mercuriale.

℞. *Succi herbæ Mercurialis fœminæ f. a. depurati lib. VI.*
Mellis depurati lib. IV.
Coque f. a. in Syrupi consistentiam.

Mel Rosarum.

℞. *Rosarum rubrarum recentium lib. III.*
Aquæ fontis calentis lib, XII.
Infundantur simul per 24 horas, & exprimantur, eadem infusio tertio iteretur, deindè infusio expressa cum
Mellis depurati lib. X.
Coquatur in Syrupi consistentiam.

Diamorum.

℞. *Succi Mororum Batinorum. i. Rubi humilis immaturorum lib. I. ß.*
Succi Mororum Celsi domesticorum ex arbore pendentium non maturorum Unc. IX

Coque

Coque lento igne in vaſe terreo vitreato ad tertiæ partis conſumptionem, & poſt depurationem adde

Mellis optimi depurati lib. I. ß.
Sapæ Unc. III.

Coque leniter ad Syrupi conſiſtentiam.

LOOCH SEU LINCTUS.

Looch ſanum & expertum.

℞, *Paſſularum exacinatarum,*
Caricarum pinguium,
Dactylorum an. Unc. II.
Zizifa,
Sebeſten an. Num. XXX.
Radicum Ireos Florentinæ,
Glycyrrhizæ,
Fol. Hyſopi,
Calaminthæ,
Polytrici,
Sem. Aniſi,
Fœniculi,
Lini,
Cinnamomi an. Unc. ß.

Decoquantur omnia ſ. a. in aquæ lib. V. ad remanentiam librarum duarum: expreſſioni adde

Penidiorum lib. II.

Et rursùs coquantur ad Mellis conſiſtentiam, tumque adjice minutim contuſas

Pinearum purgatarum drach. V.
Amigdalarum dulcium mund. drach. III

Qui

Quibus ritè commixtis inſperge pulveres ſequentium

Rad. Glycyrrhizæ raſæ,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Amyli an. drach. III.
Rad. Ireos Florentinæ drach. II.

Agitentur omnia ſimul, donec albeſcant, & linctus formam nanciſcantur.





CLASSIS QUARTA.

De Rob, Conditis, Conservis, & Tragematis.

Parantur hæc eodem modo.

Rob. Berberorum,
Cerasorum nigror.
rubror.
Ribesiorum &c.

℞. *SUcci cujusvis recenter expressi lib. II.*
Sacchari albissimi depurati lib. I.
Coquantur lento igne in vase fictili donec Gelatinæ consistentiam acquirant.

Rob Cydoniorum.

℞. *Succi Cydoniorum depurati lib. XII.*
Coque in vase fictili lento igne ad remanentiam lib. IV. tum adde
Sacchari albissimi depurati lib. IV.
Et repetitâ coctura, f. Rob s.a.

Rob Sambuci.

℞. *Succi Baccar. Sambuci maturarum q.v.*
Inspissetur sensim in vase fictili igne lento, addendo pro quaque librâ succi
Sacchari Unc. III.
Eodem modo paratur *Rob Ebulinum, Juniperi*, & *Veronicæ*, nisi quod in hoc postremo sacchari & succi tantundem expetatur.

CON-

CONDITA.

Radicum, Caulium, Corticum, Florum, Fructuum, Pulparum.

℞. *Radicum Eryngii q. v.*

Mundentur exteriùs, coquantur in sufficienti quantitate aquæ ad mollitiem Radicum, in decocto dissolve

Sacchari albissimi pondus æquale.

Et coque ad consistentiam Syrupi crassioris, auferendo spumam, & postquàm refrixerit adde Radices, & post aliquot dies decantetur Syrupus, & recoquatur ad debitam Syrupi consistentiam, & Radicibus adde dum adhuc calet; & si superflua sit humiditas etiam tertio Syrupus recoquendus est.

His non multùm dissimiliter condiuntur.

Radices { *Acori vulgaris*, *Angelicæ*, *Borraginis*, *Buglossi*, *Cichorii*, *Enulæ Campanæ*, *Pimpinellæ*, *Satyrii*, *Sisari*, *Symphyti majoris*, *Scorsoneræ*, &c.

2. *Corticum Aurantiorum recentium q. v.*

Tenuiter aufer interiorem partem albicantem, & in aqua fontana macera, & coque donec leniter mollescant, tum procedatur

datur ut de *Radicibus Eryngii* dictum est.

Pari modo parantur:

Cortices { *Citriorum*, *Limonum*, &c.

CONSERVÆ ET SACCHARATA.

Herbarum Absinthii utriusque,
Acetosellæ,
Florum Aurantiorum,
Calendulæ,
Borraginis,
Violarum,
Salviæ,
Rosarum rubrarum,
damascenarum,
Rorismarini &c.

Ex his omnibus fiunt Conservæ cum Sacchari albissimi triplâ proportione notandum tamen quod humidioribus singulis libris Sacchari libræ duæ sufficiant.

TRAGEMATA.

Tabellæ Aromatici Rosati.

℞. *Specierum Aromatici Rosati drach. II.*
Sacch. albissimi aqua Rosar. soluti Unc. II

Misce f. s. a. Tabellæ.

Tabellæ Diacodii.

℞. *Seminum Papaveris albi Unc. I.*
Extrahatur s. a. emulsio cum
Aquarum Rosarum. &
Scabiosæ an. Unc. I. ß. cui add
Sacchari albi conglobati Unc. IV.

Coq

Coque s. a. continuò movendo ad consistentiam Tabellarum.

Saccharum Perlatum.

℞. *Sacchari albissimi lib. I.*
Aquæ Rosarum q. s.
Coquantur in consist. Tabell. sub finem coctionis immiscendo
Margarit. præp. & trit. Unc. ß.
F. s. a. Tabellæ.





CLASSIS QUINTA.

De Electuariis Solutivis.

Benedictum Laxativum.

℞. *T*Urpethi drach. X.
Radicum Esulæ minoris præparat.
Hermodactylorum,
Diagridii,
Rosarum rubrarum an. drach. V.
Zinziberis,
Galangæ,
Garyophyllorum,
Cardamomi,
Amomi, vel ejus defectu *Acori*,
Piperis longi,
Macis,
Spicæ Nardi,
Croci Orientalis,
Sem. Apii,
Carui,
Fœniculi,
Saxifragiæ,
Milii Solis,
Asparagorum,
Rusci,
Salis Gemmei pulverisatorum an. drach. I
Mellis despumati lib. I. ß.

Fiat *Electuarium* lege artis. Possun etiam species per se in officinis commod reservari.

Caryo

Caryocoſtinum.

℞. *Garyophyllorum,*
Coſti odorati,
Zinziberis,
Cinnamomi an. drach. II.
Hermodactylorum,
Diagridii an. Unc. ß.

Miſce, fiat omnium pulvis, & cum triplo mellis ex vino albo deſpumati & cocti f. ſ. a. Electuarium.

Cholagogum.

℞. *Pulp. prunor. acido dulc. Unc. X.*
Cremor. Tartari,
Scamm. optimi an. Unc. II.
Rhabarb. Electi drach. X.
Cinnamomi acuti Unc. ß.
Santali citrini drach. II.
Sacchari clarificati Unc. XVI.

Miſce f. ſ. a. Electuarium.

Dia-Catholicon.

℞. *Rad. Polypodii quercini recent. Unc. IV.*
Sem. Fœniculi Unc. I.
Aquæ fontis lib. IV.

Bulliant ad dimidias: colato adde
Sacchari albi Farinacei lib. II.

Coquantur in Syrupum, quo diſſolve
Pulparum Caſſiæ,
Thamarindorum an. Unc. II.

Diſſolutis adde ſequentia pulveriſata,
Fol. Sennæ mundatorum Unc. II.
Rhabarbari electi,

Mechoacannæ an. Unc. I.
Florum Violarum ſiccarum,
Seminum Aniſi an. Unc. ß.
Glycyrrhizæ,
Seminum quatuor frigidorum majorum enucleatorum an. drach. II.
Miſce f. ſ. a. Electuarium.

Dia-Phœnicum.

℞. *Pulpæ Palmularum in hydromelite macerat. coctæ, & per ſetaceum tranſmiſſæ.*
Penidiorum recentium an. lib. ß.
Amigdalarum dulcium expurg. Unc. III. ß.
Contuſis & permixtis omnibus, adde
Mellis deſpumati lib. II.
Coquantur paulùm, deinde inſperge ſequentes pulveres.
℞. *Zinziberis,*
Piperis longi,
Maceris,
Cinnamomi,
Fol. Ruthæ ſiccorum,
Sem. Dauci,
Fœniculi an. drach. II.
Turpethi Unc. IV.
Diagridii Unc. I. ß.
Miſce, f. ſ. a. Electuarium.

Hydragogum.

℞. *Baccar. Juniper. in aqua coct. Expreſſ. & ad pulpæ conſiſtent. redact.*
Pulpæ tamarindorum an. Unc. IV.
Rad. Jalappæ Unc. ß.

Scam-

Scammonii Electi Unc. I.
Cinnam. acuti,
Sem. Fœniculi dulcis an. drach. II.
Sacchari clarificati Unc. X.
Misce f. s. a. Electuarium.

Electuarium de Succo Rosarum.

℞. *Succi Rosarum pallidarum depurati,*
Sacchari albi conglobati an. lib. I. ß.
Coctis s. a. insperge sequentes pulveres:
Scammonii præparati Unc. I. ß.
Santalorum omnium.
Cinnamomi an. drach. II.
Camphoræ scrup. I.
Misce f. s. a. Electuarium.

Hyera Pycra.

℞. *Cinnamomi,*
Maceris,
Azari,
Spicæ Indicæ,
Croci,
Mastices pulverisatorum an. drach. VI.
Aloës non lotæ pulverisatæ Unc. XII. ß.
Mellis optimi depurati lib. IV. Unc. III.
Species melli despumato non sunt inji-
iendæ, nisi id ipsum ab igne fuerit remo-
um, ac ferè refrigeratum; alioquin Aloë
ursùs conglobatur, & picis instar indu-
ata coit. Species etiam seorsim serventur
a officinis.

Confectio Hamech.

℞. *Fol. Sennæ mundat.*
Rad. Polypodii quercini,
Rhabarb. Electi,
Agarici albi &
Pulpæ colocynthidis in nodulo ligator.
Florum Violarum,
Herb. Epithymi an. Unc. II.
Absinthii vulgaris,
Thymi an. Unc. I.
Sem. Anisi,
Fœniculi,
Rosar. rubrar. an. Unc. ß
Infunde & coque in s. q. seri lactis colaturæ expressæ adde
Succi fumariæ depurati,
Sacchari an. lib. I. ß.
Decoctis ad mellis consistentiam & percolatis adde
Pulpæ Cassiæ,
Prunorum,
Tamarindorum.
Mannæ calabrinæ an. Unc. I. ß.
In debitam consistentiam redactis insperge
Folior. Sennæ mundat.
Rhabarb. Electi an. Unc. I.
Scammonii præparati Unc. I. ß.
Semin. Fumariæ,
Anisi,
Spicæ Nardi Indicæ an. drach. II.
F. s. a. Electuarium.

Passu-

Passulæ Corinthiacæ laxativæ.

℞. *Passularum Corinthiacarum mundatarum Unc. IV.*

Bulliant in sufficienti quantitate aquæ ad mollitiem, & in Unc. VIII. prædicti decocti, & vini albi Unc. II. infunde per 24. horas

Fol. Sennæ mundatorum drach. VI.
Cremoris Tartari pulverisati drach. II.
Seminis Anisi drach. I.

Posteà colentur, & colaturæ adde passulas jam coctas cum *Mannæ & Sacchari albi ana Unc. II.* & post unam alteramve ebullitionem repone.

Eodem modo parantur *Pruna Damascena* officinis usitata.



CLAS-



CLASSIS SEXTA.

Species Aromaticas & Pulveres continens.

Species Aromatici Rosati.

℞. *ROsar. rubrar. exungulatarum dr. XV.*
Glycyrrhizæ rasæ drach. VII.
Ligni Aloës,
Santali Citrini an. drach. III.
Cinnamomi electi drach. V.
Macis,
Caryophyllorum an. drach. II. ß.
Gummi Arabici,
Tragacanthi an. scrup. VIII.
Nucis Moschatæ,
Cardamomi minoris,
Galangæ an. drach. I.
Spicæ Nardi scrup. II.
Misce f. s. a Pulvis.

Nota, quod omnes Pulveres servandi sint in vase vitreo, vel fictili vitreato ad usum.

Species Dia-margariti frigidi.

℞. *Margaritarum præparatarum drach. III.*
Radicum Contrayervæ,
Cinnamomi optimi,
Trium-santalorum,
Ligni Aloës,

Zedoa-

Zedoariæ,
Baccarum Myrti,
Rasuræ Eboris,
Typhorum cornu Cervorum spagyricè præparatorum,
Sem. Portulacæ,
Endiviæ,
Oxalidis,
Citri an. drach. I.
Coralli utriusque præparati an. drach. ß.
Flor. Buglossæ,
Rosarum rubrarum,
Violarum,
Nymphææ an. drach. I.
Misce f. s. a. Pulvis.

Species Diambræ.

Cinnamomi optimi,
Rad. Zedoariæ,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis Moschatæ,
Folij Indici an. drach. III.
Spicæ Indicæ,
Cardamomi majoris,
minoris an. drach. I.
Zinziberis drach. I. ß.
Ligni Aloës,
Santali Citrini,
Piperis longi an. drach. II.
Ambræ griseæ drach. I. ß.
Misce f. s. a. Pulvis.

Spe-

Species Dianthos.

℞. *Florum Rorismarini Unc. I.*
Rosarum rubrarum exungulatarum,
Violarum,
Glycyrrhizæ rasæ an. drach. VI.
Garyophyllorum,
Spicæ,
Nucis Moschatæ,
Galangæ,
Cinnamomi optimi,
Zinziberis,
Zedoariæ,
Macis,
Ligni Aloës,
Cardamomi minoris,
Seminum Anisi,
Anethi an. scrup. IV.
Misce, & f. s. a. Pulvis.

Species Diarrhodonis.

℞. *Rosarum rubrar. exungulatarum dr. X*
Santali albi,
rubri an. drach. II.
Ligni Aloës,
Tragacanthi,
Eboris usti an. scrup. II.
Macis,
Spicæ Nardi,
Rhabarbari optimi,
Cinnamomi,
Garyophyllorum,
Croci,
Radicum Asari,

Fructuum Berberorum exsiccatorum,
Sem. Anisi,
Cardamomi,
Fœniculi,
Ocymi,
Papaveris albi,
Quatuor frigidorum minor. mundat.
Scariolæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Mastiches an. scrup. I.
Rasuræ cornu Cervi,
Margaritarum præparatarum an. scrup. I.
Camphoræ grana VII.
Misce, & f. s. a. Pulvis.

Species Dia-tragacanthi frigidi.

℞. *Gummi Tragacanthi albi Unc. ß.*
Arabici drach. II. ß.
Amyli drach. I.
Glycyrrhizæ,
Nucleorum sem. Citrulli,
Cucumeris,
Cucurbitæ,
Melonum an. drach. ß.
Sem. Papaveris albi scrup. II. & grana V.
Sacchari candi drach. VI.
Misce, & f. s. a. Pulvis.

Species Lætificantis.

℞. *Melissæ,*
Corticum Citri extimorum exsiccatorum,
Garyophyllorum,
Mastiches,
Croci,

Cinna-

Cinnamomi,
Nucis Moschatæ,
Cardamomi majoris,
Nucleorum seminum Pæoniæ,
Been albi,
rubri,
Zedoariæ,
Doronici veri,
Sem. Ocymi Garyophyllati an. Unc. ß.
Ligni Aloës,
Ossis de corde Cervi,
Margaritarum præparatarum an. drac. ß
Rasuræ Eboris drach. I.
Misce, f. s. a. Pulvis.

Species Dia-Curcumæ.

℞. *Croci,*
Asari,
Sem. Petroselini Macedonici,
Dauci,
Anisi,
Apii an. Unc. ß.
Rhabarbari,
Rad. Angelicæ,
Valerianæ majoris,
Spicæ Indicæ an. drach. VI.
Scolopendrii seu Ceterach drach. II. ß.
Costi,
Myrrhæ,
Cassiæ Ligneæ,
Schœnanthi,
Cubebarum,
Rubiæ,
Succi Absinthij,

Eup

Eupator.
Olei Garyophillorum an. drach. II.
Calami Aromatici,
Cinnamomi an. drach. I. ß.
Scordij veri,
Succi Glycyrrhisæ an. drach. II. ß,
Tragacanthi drach. I.
Misce f. s. a. Pulvis.

Species Dia-Galangæ.

℞. *Rad. Galangæ drach. VI.*
Ligni Aloës,
Sem. Cumini,
Levistici,
Rad. Acori,
Zinziberis,
Piperis albi,
longi,
Garyophillorum,
Cinnamomi,
Macis an. drach. I. ß.
Folior. Calaminthæ,
Menthæ siccat.
Spicæ Nardi Indicæ,
Sem. Apii,
Anisi,
Cardam. min.
Carui,
Fæniculi an. drach. I.
Misce f. s. a. Pulvis.

Pulvis Bezoardicus Magistralis.

Bezoar. mineral. Unc. II.
Terræ Sigillatæ,

Coral-

Corallorum præpar. an. Unc. I.
Cinnabar. nativi,
Coccinellæ an. Unc. ß.
Camphoræ drach. II.
Misce f. Pulvis.

Pulvis è Chelis Cancrorum.

℞. *Margarit. Orient. præparat.*
Oculor. Cancr.
Corallor. rubr.
Succini albi,
Bezoard. Occident.
Pulv. Viperar.
Cornu Cervi spagyr. præpar. an. dr. VI.
Contra-yervæ,
Serpentariæ Virgin. an. Unc. ß.
Chelorum Cancrorum ad pondus omnium.
Misce f. Pulvis.

Pulvis Cachecticus.

℞. *Limaturæ Chalybis subtiliss. pulver. Unc. I.*
Rad. Aronis drach. I. ß.
Ocul. Cancr.
Cornu cervi spagyr. præpar.
Succini,
Cinnamomi acuti an. scrup. II.
Misce f. Pulvis.

Pulvis ad Casum.

℞. *Sanguinis Draconis optimi drach. II.*
Sanguinis Hirci optimè præparati,
Oculorum Cancrorum præparatorum,
Boli Armeni optimi an. drach. III.
Myrrhæ rubræ,
Radicum Rubiæ tinctorum an. drach. I

Nuc

Nucis Moschatæ drach. I. ß.
Rhabarbari optimi,
Spermatis Ceti recentioris an. drach. I.
Misce, & fiat Pulvis subtilissimus.

Pulvis Liberans.

℞. *Boli Armeni debitè præparati Unc. I. ß.*
Terræ Lemniæ Orientalis Unc. I.
Corallorum albor. præparatorum drac. III.
rubrorum præparat. drach. II.
Lapidum pretiosorum, Smaragdi, Rubini, Hyacinthi an. drach. II.
Margaritarum præparatarum drac. II. ß.
Cinnamomi drach. I.
Garyophillorum drach. ß.
Seminis Acetosæ drach. I.
Corticum Citri,
Santali rubri,
albi an. drach. ß. grana XV.
Spodii drach. II. ß.
Rasuræ Eboris drach. I. ß.
Croci Orientalis drach. ß.
Misce, & f. omnium Pulvis, cui admisce
Folia Auri bracteati Num. XX.

Pulvis contra Abortum.

Rasuræ Eboris,
Granorum Chermes an. drach. I.
Santali rubri drach. ß.
Garyophillorum scrup. I.
Nucis Moschatæ scrup. II.
Radicum Tormentillæ drach. ß.
Margaritarum præparatarum,
Coralli utriusque præparator. an. scrup. I.

Folia auri Num. III.
Sacchari tabulati perlati drach. III.
Miſce, & f. ſ. a. Pulvis.

Pulvis de Gutteta.

℞. *Rad. Pæoniæ maris Lunâ decreſcente collectarum.*
Seminum ejuſdem.
Dictamni albi,
Viſci quercini veri an. Unc. ß.
Seminum Atriplicis drach. II.
Cranii humani crudi pulveriſati drac. III
Corallorum rubrorum præparatorum,
Hyacintorum præparatorum an. drac. I. ß
Ungulæ Alcis præparatæ Unc. ß.
Foliorum Auri drach. I.
Miſce, & f. ſ. a. Pulvis.

Pulvis Haly.

℞. *Sem. Papaveris albi drac. I. & grana XV*
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Spodii ex Ebore,
Amyli,
Glycyrrhizæ an. ſcrup. I. & grana II
Sem. Portulacæ,
Malvæ,
Althææ mundat. an. dr. ß. & gr. VI
Sem. quatuor frigidorum maj. excortica
Cydoniorum excorticatorum an. ſcr
II. & grana XII.
Sacchari candi albi ad pondus omnium.
Miſce, & f. ſ. a. Pulvis.

Nota, quod hic Pulvis ſemper recen parari debeat.

Pulvis Hæmophthoicus.

℞. *Capitis mortui Vitrioli post spiritûs & olei extractionem relicti & subtilissimè pulverisati lib. I.*

Infunde per horas 24. in aquæ ferventis lb. VI. posteà decanta aquam per inclinationem, & novam aquam semper singulis 24. horis affunde, & vigesies hunc laborem repete, donec Pulvis omni acrimoniâ & austeritate privatus sit, insipidusque evadat.

Aquas infusionum ne abjicias, sed ad sum Medicum serva in vase vitreo.

Pulvis Pleuriticus.

℞. *Rasuræ minutissimæ dentium crudorum Apri Unc. ß.*
Flor. Papaveris Rhæados drach. I. ß.
Priapi Cervi drach. III.
Oculorum Cancrorum præp. an. drac. II.
Radicum Bardanæ,
Sanguinis Hirci præparati an. Unc. ß.
Croci drach. I.
Misce, & fiat Pulvis tenuissimus.

Pulvis Reginæ.

℞. *Rad. Curcumæ Unc. I.*
Sem. Saxifragiæ,
Milij Solis an. drach. III.
Sem. Anisi,
Apii,

Carui,
Cumini.
Fœniculi,
Petroſelini,
Rutæ an. drach. II.
Glycyrrhizæ raſæ drach. III.
Granorum Juniperi,
Baccarum Lauri,
Nucis Moſchatæ,
Galangæ,
Sanguinis Hircini præparati,
Cinnamomi acuti an. drach. II.
Croci ſcrup. I.

Miſce, & fiat omnium Pulvis, cui pro arbitrio Medici additur ſaccharum.

Pulvis Stomachicus.

℞. *Rad. Ari præparatarum Unc. II.*
Pimpinellæ Saxifragæ,
Acori vulgaris an. Unc. I.
Oculorum Cancrorum præparatorum,
Cinnamomi acuti an. drach. III.
Salis Abſinthii,
Juniperi an. drach. I.

Miſce f. Pulvis.

Pulvis contra Vermes.

℞. *Cornu Cervi uſti Unc. II.*
Seminum Zedoariæ Unc. I.
Caulium,
Portulacæ,
Corallinæ an. Unc. ß.

Miſce, & fiat Pulvis.



CLASSIS SEPTIMA.

Continens Pulveres solutivos.

Pulvis Catholicus.

℞. *Diagridii drach. IX.*
Antimonii per trinam detonationem cum tertiâ parte nitri parati & non edulcorati drach. VI.
Tartari crystallini drach. III.
Misce f. Pulvis.

Pulvis Dia-Carthami.

℞. *Medullæ seminis Carthami,*
Hermodactylorum mundatorum,
Specierum Dia-traganthi frigidi an. Unc. ß.
Turbith optimi drach. VI.
Diagridii drach. III.
Zinziberis,
Cinnamomi an. drach. II.
Misce, & f. s.a. Pulvis.
Nota, quod *Diagridium* semper sit per se terendum, posteà aliis immiscendum.

Pulvis Dia-turbith cum Rheo.

℞. *Rhabarbari optimi drach. X.*
Turbith albi & gummosi,
Hermodactylorum mundator. an. Unc. I.
Diagridii Unc. ß.
Zinziberis,

Santali albi,
rubri,
Florum Violarum an. drach. I. ß.
Masticbes,
Semin. Anisi,
Cinnamom.
Croci an. drach. ß.
Misce, & f. s. a. Pulvis.

Pulvis Hermodactylatæ Venetæ.

℞. *Hermodactylorum à cortice superiori mundatorum Unc. I. ß.*
Turbith alb. & gummosi Unc. I.
Glycyrrhizæ rasæ,
Mechoacæ albæ an. drach. VI.
Diagridii drach. III.
Zinziberis drach. II.
Misce, & f. s. a. Pulvis.

Pulvis Sennæ Montagnanæ.

℞. *Fol. Senæ Orientalium mundator. Unc. II.*
Cremoris Tartari Unc. ß.
Semin. Fœniculi dulcis drach. II.
Salis gemmæ,
Macis,
Cinnamomi an. drach. I.
Misce, & fiat Pulvis.

Pulvis pro Suppositoriis.

℞. *Aloës drach. II.*
Cumini,
Rutæ,
Salis gemmæ an. drach. I.
Misce & f. Pulvis qui cum s. q. mellis cocti subigatur & f. Supposit.
Si fortiora desiderentur potest addi
Trochis. alhandal drach. I.

CLASSIS OCTAVA.

De Antidotis & Opiatis.

Confectio Alkermes.

℞. *SYrupi granorum Kermes Montepessulo delati lib. II. ß.*
Calefacto adde
Ambræ griseæ minutim incisæ drach. II.
Liquefactâ Ambrâ insperge sequentes pulveres
Ligni Aloës,
Cinnamomi an. drach. VI.
Lapid. Lazuli præpar.
Margarit. Orient. an. drach. II.
Fol. Auri N. XX.
Misce f. Electuarium.

Diascordium Fracastorii.

℞. *Fol. Scordii siccator.*
Rosar. rubrar. an. Unc. I.
Boli Armeni veri Unc. II.
Rad. Bistortæ,
Gentianæ,
Tormentillæ,
Cassiæ ligneæ,
Cinnamomi,
Dictamni cretici,
Sem. Acetosæ,
Styracis calamitæ,

Galbani,
Gummi Arabici an. Unc. ß.
Opii Thebaici præpar.
Zinziberis,
Piperis lorgi an. drach. II.
Mellis despumati lib. III.
Vini generosi Canarini q. s.
F. s. a. Opiatum.

Confectio Hyacinthorum.

℞. *Hyacinthorum,*
Coralli rubri
Boli Armeni
Terræ Lemniæ an. Unc. ß.
Granorum Kermes,
Rad. Tormentillæ,
Dictamni,
Sem. Acetosæ,
Limonum,
Portulacæ,
Flor. Rosarum rubr.
Croci,
Santalor. omnium,
Rasuræ Eboris an. scrup. II.
Cornu cervi drach. III.
Sapphiri,
Smaragdi,
Topasii,
Margaritarum,
Fol. Auri,
Argenti an. scrup. II.
Syrupi de Cortice citri q. s.
Misce f. s. a. Electuarium.

Mithri-

Mithridatium Damocratis.

℞. *Radicum Zinziberis*,
Spicæ Nardi mundatæ,
Cinnamomi,
Croci Britannici,
Agarici albi & levis,
Myrrhæ electæ,
Thuris masculi,
Sem. Thlaspios an. drach. X.
Seseleos Massiliensis,
Costi odorati,
Fol. Malobatri, ejus loco, *Corticum exteriorum Citri*,
Schœnanthi,
Stœchados Arabicæ,
Piperis longi,
Succi Hypocistidos,
Galbani in guttis,
Opoponacis in guttis,
Styracis Calamitæ in guttis,
Therebintinæ Cypriæ,
Opobalsami, ejus loco, *Olei Nucis Moschatæ* per expressionem facti,
Castorei an. Unc. I.
Cassiæ ligneæ,
Foliorum Polij montani albi,
Scordii veri,
Piperis albi,
Carpobalsami, ejus loco, *Gran. Juniperi*,
Seminis Dauci Cretici,
Bdellij,
Trochiscorum Cypheos an. drach. VII.
Nardi Celticæ purgatæ,

Radicum

Radicum Gentianæ,
Dictamni Cretici,
Rosarum rubrarum exungulatarum,
Gummi Arabici vermiculati,
Opii Thebaici nitidi præparati,
Sem. Cardamomi minoris,
Fœniculi,
Petroselini Macedon, an. drach. V.
Rad. Acori,
Asari,
Valerianæ majoris,
Sem. Anisi,
Sagapeni an. drach. III.
Rad. Meu Athamantici,
Sem. Hyperici,
Acaciæ,
Lumborum Scinci an. drach. II. ß.
Mellis despumati optimi & debitè cocti lib. IX. Unc. VIII. & drach. II.

Dissolvantur succi, & Gummi (præter Arabicum & Thus, quæ teri debent) vino Malvatico, & f. s. a. Electuarium.

Philonium Romanum.

℞. *Piperis albi,*
Cassiæ ligneæ,
Cinnamomi an. drach. II.
Euphorbij,
Pyretri an. drach. ß.
Zedoariæ,
Spicæ Nardi an. scrup. II.
Sem. Hyosciami albi Unc. ß.
Opij præparati drach. II. ß.
Croci drach. ß.

Casto-

Castorei,
Myrrhæ an. drach. I. ß.
Sem. Apij,
Fœniculi,
Dauci,
Petroselini an. drach. I.
Mellis optimi despumati lib. I.

Dissolvatur *Opium* cum modico vini, cui admisceantur *Crocus*, & *Euphorbium* subtilissimè pulverisata, & addito melle inspergantur Pulveres, & misceantur, fiatque s. a. Electuarium Opiatum.

Requies Nicolai.

℞. *Flor. Rosarum rubrarum exungulatarum.*
Violarum an. drach. III.
Opij præparati,
Sem. Papaveris albi,
Hyosciami albi,
Scariolæ,
Lactucæ,
Portulacæ,
Psyllii,
Corticum Radicum Mandragoræ,
Nucis Moschatæ,
Cinnamomi an. drach. I. ß.
Santali albi,
citrini,
rubri,
Spodij,
Tragaganthæ an. scrup. II. & grana V.
Mellis despumati optimi & cocti triplum.

Misce, & fiat Electuarium Opiatum.

The-

Theriaca Andromachi ſenioris.

℞. *Trochiſcorum Scylliticorum Unc. VI.*
De Viperis,
Magmatis Hedycroi,
Piperis longi,
Opij Thebaici præparati an. Unc. III.
Radicis Ireos Florentinæ,
Agarici albi & levis,
Comarum Scordij veri,
Roſarum rubrarum exungulatarum,
Cinnamomi,
Opobalſami, ejus loco, *Olei Nucis Machatæ,*
Succi Glycyrrhizæ,
Sem. Napi agreſtis an. Unc. I. ß.
Rad. Coſti odorati,
Quinquefolij,
Rhapontici, vel ſi deſit, *Rhabarbari,*
Spicæ Nardi Indicæ,
Zinziberis,
Caſſiæ ligneæ,
Fol. Dictamni Cretici,
Calaminthæ montanæ,
Praſſii albi,
Schœnanthi,
Stœchados Arabicæ,
Croci Britannici,
Piperis albi,
nigri,
Sem. Petroſelini Macedonici,
Therebenthinæ Cypriæ,
Thuris maſculi,
Myrrhæ an. drach. VI.

Rad,

Rad. Gentianæ,
Meu Athamantici,
Valerianæ majoris,
Nardi Celticæ,
Foliorum Malobatri, ejus loco, *Corticum Limonis ſiccatorum,*
Polij montani albi,
Comarum Chamædrijos,
Chamæpyteos,
Hyperici,
Carpobalſami.ejus loco,*Baccar.Juniperi*
Amomi, ejus loco, *Acori veri,*
Sem. Aniſi,
Ammios,
Cardamomi minoris,
Fœniculi,
Seſeleos Maſſilienſis,
Thlaſpios,
Terræ ſigillatæ Orientalis,
Chalcitidis præp.ad color. cineritium uſque
Succi Acaciæ condenſati,
Hypociſtidis,
Styracis calamitæ in guttis,
Gummi Arabici vermiculati,
Sagapeni an. Unc. ß.
Radicum Ariſtolochiæ tenuis,
Summitatum Centaurij minoris,
Sem. Dauci Cretici,illius loco,*Noſtratū,*
Galbani in guttis,
Opoponacis in guttis,
Bituminis Judaici,
Caſtorei an. drach II.
Mellis optimi deſpumati & ad conſiſtentiam cocti lib. XIV. Unc. V. & dr. II.

Diſſol-

Diſſolvantur Succi & Gummi vino Malvatico, fiatque ſ. a. Electuarium.

Theriaca Dia-teſſaron.

℞. *Rad. Gentianæ,*
Ariſtolochiæ rotundæ,
Baccarum Lauri excorticatarum,
Myrrhæ an. Unc. I.
Mellis deſpumati lib. I.
Miſce, & f. ſ. a. Electuarium.

Electuarium è ſucco Ruthæ.

℞. *Rad. Ariſtolochiæ longæ veræ,*
Rotundæ,
Rubiæ tinctorum,
Baccarum Lauri excorticatarum,
Granorum Juniperi,
Sem. Dauci,
Agni caſti,
Rutæ,
Sabinæ an. drach. I.
Croci,
Lapidis Gagatis,
Myrrhæ,
Caſtorei an. ſcrup. I.
Nucleorum ſeminum Pæoniæ ſcrup. II.
Dictamni Cretici drach. ß.
Fiat omnium pulvis, & cum
Sacchari albi ſucco Rutæ diſſoluti Unc. III.
Fiat lege artis Electuarium.

CLAS-

CLASSIS NONA.

De Pilulis, Extractis, & Essentiis.

Pilulæ Aloëphanginæ.

℞. *Cinnamomi,*
Garyophillorum,
Cardamomi minoris,
Nucis Moschatæ,
Macis,
Calami aromatici,
*Carpobalsami,*ejus loco,*Baccar. Juniperi*
Schœnanthi,
Ligni Aloës,
Santali citrini,
Rosarum rubrarum exungulatarum,
Absinthij siccati an. Unc. ß

Ex his crassiusculè tritis educatur per spiritum vini tinctura in vase vitreo probè clauso: in *Colaturæ lib. III.* nutriatur.

Aloës purissimæ lib. I.

Cui dissolutæ adde

Mastiches,
Myrrhæ pulverisatarum an. Unc. ß.
Croci drach. II.
Balsami Peruviani drach. I.

Tandem absumptâ humiditate superfluâ, super cineres calidos, aut in Hypocausto redigantur in Massam Pilularum.

Pilulæ

Pilulæ Cochiæ.

℞. *Specierum Hyeræ ſimplicis Galeni drac. X.*
Trochiſcorum Alhandal dr. III. & ſcrup. I.
Diagridij drach. II. ß.
Turpethi,
Stœchados an. drach. V.
Miſce cum Syrupo de *Stœchade*, fiat Maſſa.

Pilulæ Fœtidæ.

℞. *Gummi Sagapeni in guttis,*
Ammoniaci in guttis,
Opoponacis in guttis,
Bdellij in guttis,
Trochiſcorum Alhandal,
Sem. Rutæ agreſtis, vel
Hortenſis ſiccæ,
Aloës,
Epithymi an. drach. V.
Hermodactylorum,
Eſulæ præparatæ an. drach. II.
Diagridij drach. III.
Cinnamomi,
Spicæ Indicæ,
Croci,
Caſtorei an. drach. I.
Turbith Unc. ß.
Zinziberis drach. I. ß.
Euphorbij ſcrup. II.
Succi Porri depurati quantùm ſufficit, fiat Maſſa.

Obſervandum *Succum Porri* coquendum eſſe cum pauco Melle.

Pilulæ

Pilulæ de Nitro.

℞. *Aloës,*
Trochiscorum Alhandal,
Diagridij,
Hellebori nigri flore purpureo,
Bdellij,
Gummi Arabici an. drach. II.
Euphorbij præparati,
Nitri an. drach. I.
Misce cum Melle Rosato, & fiat Massa

Pilulæ Ruffi.

℞. *Aloës electæ Unc. II.*
Myrrhæ Unc. I.
Croci Unc. ß.
Cum Syrupo Limonum fiat Massa.

Pilulæ Spleneticæ.

℞. *Rad. quinque aperient. mundat. an. Unc. I.*
Corticum Radicum Capparum,
Tamarisci an. Unc. ß.
Herb. Fumariæ,
Cardui benedicti,
Chamædryos,
Scolopendriæ,
Eupatorij Cannabini an. m. I.
Ceterach,
Linguæ Cervinæ an. m. ß.
Bulliant s. a. in sufficienti quantitate aquæ Endiviæ ad lib. III. In colatura effervescant, & macerentur.
Fol. Senæ mundatorum Unc. IV.
Sem. Anisi,

Fœniculi an. Unc. ß.
In colatura dissolve
Aloës lotæ Unc. VI.
Resinæ Scammonij Unc. III.
Evapora ad consistentiam Pilularum.

Pilulæ de Cynoglossâ.

℞. *Myrrhæ optimæ drach. VI.*
Thuris masculi drach. V.
Rad. Cynoglossæ siccatarum,
Sem. Hyosciami,
Opij præparati an. Unc. ß.
Croci,
Castorei an. drach. I. ß.
Misce, & cum *Syrupo de Stæchade* fiat Massa. *Opium* tritum cum Syrupo primùm subigitur, tum reliqua simplicia.

DE EXTRACTIS.

Extractum Catholicon.

℞. *Pulpæ Colocynthidis drach. VI.*
Agarici albi,
Hellebori nigri,
Pulv. Diarrhod. an. Unc. ß.
Impone Matracio cum s. q. Spirit. Vini extrahatur Tinctura in B. M. tum percolatæ adde pulverum
Aloës lucidæ Unc. I.
Scammonij præparati Unc. ß.
Evaporent in consistentiam Extracti.
Eodem modo fiunt extracta aliarum pillularum.

Lau-

Laudanum Opiatum.

℞. Opij Thebaici ſpiritu vini diſſoluti paululum cocti & colati Unc. I.

Miſceatur cum tincturâ mediante ſpiri-u vini extractâ ex

Pulveris Diambræ Unc. ß.

Evaporent in conſiſtentiam pillularum ub finem addendo

Croci Britannici drach. I.

Caſtorei drach. ß.

Servetur maſſa uſui.

Reſina Scammonii.

℞. Scammonii pulveriſati q. v.

Superfunde ſpir. vini rectific. ad ſuper minentiam quatuor digitorum tranſverſ. igerantur per dies aliquot in loco calido. Colatura fortiter expreſſa per chartam bi-ulam evaporetur. Dein affuſione aquæ igidæ præcipitabitur ad fundum reſina uæ abluenda & exſiccanda eſt.

Eodem paratur modo

Reſina Agarici,
Guajaci,
Jalappæ &
Magiſterium guttæ gambæ &c.

xtractorum conficiendorum methodus generalis.

Parari poſſunt *Extracta*, ex omni ferè ateria Medica, ſeu è quovis medica-ento (ſive ſimplici, cujuſmodi ſunt her-e, flores, ſemina, &c. ſive compoſito, ualia ſunt ſpecies, maſſæ Pilularum, &c.)

quod tincturam menstruo, cui infunditur, communicare solet. Itaque sumatur cujusvis materiæ Medicæ, concisæ, contusæ, vel aliter, ut pro infusione res postulat, præparatæ quantùm vis, affundatur *Spiritûs vini*, vel *aquæ Stillatitiæ* Medici præscribentis intentioni accommodæ quantùm sufficit, maneant in infusione ad calorem Balnei, vel alium lentum, per biduum, plus minùs, prout densitas vel tenuitas materiæ postulaverit, donec liquor medicamenti tincturâ imprægnetur. Tum liquor tinctus separetur per inclinationem, affuso novo Menstruo, post infusionem, ut priùs, separando: idque toties repetendum, quoties medicamentum de se tincturam liquori impertierit. Liquores tincti conjungantur, per chartam emporeticam agantur: & tandem calore Balnei exhalet humiditas, donec materia in fundo vasis ad mellis consistentiam redigatur, quæ ad usum servanda: cui etiam ad Medici præscriptum nonnihil salis proprii, vel alterius idonei (v. g. scrupuli duo vel semidrachma ad singulas *Extracti* uncias) ut diutiùs humidum maneat, adjungi potest.

Essentia Absynthii.

℞. *Absynth. q. v.*

Affunde spirit. vini q. s. ut extrahatur tinctura

Hujus tincturæ lib. I.
Extract. absynth. Unc. ß.
Salis absynth. drach. II.

Commixta circulando digerantur donec probe unjantur.

CLASSIS DECIMA.

De Trochiſcis.

Agaricus Trochiſcatus.

℞. *Agarici albi & levis Unc. I.*

Cum ſ. q. vini Canarini cui Zinziberis drach. I. ſit infuſa cogatur ſ. a. in Trochiſcos.

Trochiſci albi Raſis, *ſeu* Sief album.

℞. *Ceruſſæ aquâ Roſarum lotæ drach. X.*
Sarcocollæ craſſioris drach. III.
Amyli drach. II.
Gummi Arabici nitidi,
Tragacanthi an. drach. I.
Camphoræ drach. ß.

Pulveriſentur ſ. a. & cum *albumine ovi aquâ Roſarum conquaſſati* fiant *Trochiſci*. Interdum pro arbitrio *Medici* additur *Opium.*

Trochiſci Alhandal.

℞. *Pulpæ Colocynthidis albæ & levis à ſeminibus purgatæ Unc. X.*

Incidatur *Pulpa* hæc minutiſſimè, & cum quantitate ſufficienti *Olei Amygdalarum dulcium recentis* fricetur & pulveriſetur: deindè ſume
Gummi Arabici,
Tragacanthi,

Bdellij an. drach. III.

Quæ ruditer contuſa macerentur in q. ſ. aquæ *Roſarum* donec diſſolvantur, & cum parte lachrymarum ſolutarum formentur *Trochiſci*, qui in umbra ſiccentur: ſiccati iterum minutiſſimè conterantur, & cum reliqua *mucilagine* rursùs formentur *Trochiſci*.

Trochiſci hi nihil aliud ſunt, quàm *Colocynthis præparata* qui imponi poſſunt omnibus compoſitionibus *Colocynthidem* recipientibus: ſicut etiam mos hucuſque obtinuit, ut in ſingulis compoſitis Pharmacis *Colocynthidem* deſiderantibus pro cruda *Colocynthide Trochiſcos* hos ſubſtituamus, quorum quoque uſus in catapotiis acuandis creber eſſe ſolebat.

Trochiſci Alkekengi.

℞. *Fructuum Halicacabi drach. I. ß.*
Sem. Citrulli,
Cucurbitæ,
Melonum an. drach. I. ß. & gr. XV.
Boli Armeni,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Sanguinis, id eſt, *Lachrimæ Draconis*,
Amygdalarum amararum mundatarum,
Pinearum mundatarum,
Succi Glycyrrhizæ,
Amyli,
Sem. Papaveris albi,
Apij,
Hyoſciami,

Ca-

Carabes, seu *Succini albi*,
Terræ sigillatæ,
Opij præparati an. drach. I.
Cum *succo Halicacabi*, vel *aqua Rosacea* in qua ejusdem *fructus sicci* fuerint macerati, fiant s. a. *Trochisci.*

Trochisci Bechici nigri.

℞. *Succi Glycyrrhizæ inspissati Unc. II.*
Styracis Calamitæ drach. VI.
Sacchari candi albi drach. X.
Specier. Diatragac. frig. drach. I. ß.
Pulv. Ireos drach. ß.
Lohoch sani drach. II.
Sacchari Penidij Unc. III.
Sacchari albissimi lib. I. & Unc. I. ß.
Mucilaginis Tragacanthi cum aqua Hyssopi factæ quantum sufficit.
Fiant *Trochisci.*

Trochisci de Capparibus.

℞. *Corticum Radicum Capparum*,
Seminum Agni casti an. drach. III.
Gummi Ammoniaci in guttis drach. II.
Sem. Nasturtij,
Nigellæ,
Fol. Calaminthæ montanæ,
Rutæ,
Rad. Acori,
Aristolochiæ rotundæ,
Succi Eupatorii inspissati,
Amygdalarum amarar. excorticatarum an. drach. I.
Fol. Scolopendrij, id est, *Ceterach*,

Rad. Cyperi rotundi,
Rubiæ tinctorum,
Gummi Laccæ an. drach. ß.
Ammoniacum in mortario calido *aceto acerrimo* diſſolve ad mellis conſiſtentiam, cui immiſce *ſuccum Eupatorij inſpiſſatum* & *pulveres*, formando ſ. a. *paſtam*, & ex ea *Trochiſcos.*

Trochiſci de Carabé.

℞. *Carabes Unc. ß.*
Cornu Cervi uſti,
Gummi Arabici toſti,
Tragacanthi,
Coralli rubri uſti,
Succi Acaciæ,
Hypociſtidos,
Balauſtiorum,
Maſtiches,
Laccæ,
Sem. Papaveris nigri aſſi an. ſcrup. IV.
Thuris,
Croci,
Opij præparati an. drach. I.
Mucilaginis ſem. Pſyllij aquâ Plantaginis extractæ q. ſ.
Formentur *Trochiſci.*

Trochiſci Cypheos.

℞. *Pulpæ Uvarum paſſarum pinguium à cortice & acinis probè mundatarum.*
Terebinthinæ Cypriæ coctæ an. Unc. III.
Myrrhæ,
Schœnanthi an. Unc. I. ß.

Ca-

Calami aromatici drach. IX.
Cinnamomi Unc. ß.
Bdellij optimi,
Spicæ Nardi,
Cassiæ ligneæ,
Radicum Cyperi,
Baccarum Juniperi an. drach. III.
Asphalati, seu *Ligni Aloës an. drach. II. ß.*
Croci drach. I.
Mellis Narbonensis despumati q. s.
Vini Canarini modicum.

Myrrha & *Bdellium* terantur in mortario calido cum *Vino Canarino* ad crassitudinem liquidi mellis, addatur mox *Terebinthina*, deindè *Pulpa ex carne Passularum* per setaceum extracta; tum *pulveres*, omnia demùm excipiantur *melle despumato* ad debitam consistentiam cocto; coganturque in *massam* ex qua fiant *Trochisci*.

Trochisci Gordonii.

R. Sem. quatuor frigidorum majorum enucleatorum,
Papaveris albi,
Malvæ,
Bombacis excorticati,
Portulacæ,
Cydoniorum,
Myrtillorum,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Nucleorum Pineorum mundatorum,
Pistachiorum,
Sacchari Candi,

Peni-

Penidij,
Glycyrrhizæ rasæ,
Mucilaginis seminum Psyllij,
Amygdalarum dulcium excorticatarum an. drach. II.
Boli Armeni,
Sanguinis, id est, *Lachrimæ Draconis*,
Spodij ex ebore,
Rosarum rubrarum exungulatarum,
Myrrhæ an. Unc. ß.

Cum quantitate sufficienti *Hydromelitis* fiant s. a. *Trochisci.*

Trochisci Hedychroi.

℞. *Ligni Asphalathi*, pro quo *Santali Citrini*,
Foliorum Majoranæ,
Mari, pro quo *Dictamni*,
Rad. Azari an. drach. II.
Phu pontici, id est, *Rad. Valerianæ maj.*
Costi,
Calami aromatici, pro quo *Acori veri*,
Ligni Aloës,
Cinnamomi,
Schœnanthi,
Opobalsami, aut *Olei Nucis moschatæ per expressionem an. drach. III.*
Cassiæ ligneæ,
Folij Malabatri, pro quo *Corticis exterioris Citri siccati*,
Spicæ Nardi Indicæ,
Myrrhæ,
Croci ana drach. VI.
Amomi, pro quo *Acori veri Unc. I. ß.*
Mastiches drach. I.

Vini

Vini Canar. quantum sufficit.

Myrrha dissolvatur cum *Vino*, mox *Crocus*, & *Mastiche* probè trita adjiciantur, deindè *Opobalsamum*, tunc reliqua in *pulverem* redacta admisceantur, *Vino* subindè affuso, & cogantur in *pastam* ex qua formentur *Trochisci* in umbra siccandi.

Trochisci de Myrrha.

℞. *Myrrhæ electæ drach. III.*
Lupinorum drach. V.
Fol. Rutæ,
Mentastri,
Pulegij Cervini, id est, *Dictamni cretici,*
Rubiæ tinctorum,
Semin. Cumini,
Assæ fœtidæ,
Sagapeni,
Opoponacis an. drach. II.

Dissolvantur *Gummi* in mortario calido, *Aceto Scyllitico*, addendo *species*, & cum quantitate sufficienti *succi Arthemisiæ* cogantur in *pastam*, ex qua formentur *Trochisci.*

Trochisci Scyllitici.

℞. *Carnis Scyllæ assatæ lib. I.*
Farinæ Orobi albi & non rufi Unc. VIII.

Tere in mortario marmoreo, & fiat *pasta* ex qua formentur *Trochisci*, qui ponantur in superiore parte ædium meridiem spectante in umbra, sæpiùs obvertendo, donec probè siccati fuerint.

Tro-

Trochisci de terrâ Sigillatâ.

℞. *Terræ sigillatæ*,
Boli Armeni,
Sanguinis, id est, *Lachrymæ Draconis*
Gummi Arabici tosti,
Rosarum rubrarum exungulatarum,
Amyli tosti,
Acaciæ,
Hypocistidis,
Lapidis Hæmatitis,
Balaustiorum,
Coralli rubri,
Carabes ana drach. I.
Spodij ex Ebore,
Margaritarum præparatarum,
Tragacanthi,
Sem. Papaveris nigri an. drach. I. ß.
Sem. Rosarum rubr. sive *Antheræ drac.* I
Portulacæ,
Cornu Cervi usti,
Thuris masculi,
Conorum Cupressi,
Croci an. drach. II.

Cum *succo* vel *aqua Plantaginis* fian *Trochisci*.

Trochisci Viperini.

Aliunde petantur.

CLAS

CLASSIS UNDECIMA.

De Oleis per expressionem.

Oleum Amygdalarum dulcium.

℞. *Amygdalarum dulcium ſiccarum non tamen rancidarum q. v.*

Contunde in mortario marmoreo minutiſſimè, & dein ex his tritis & telâ cannabinâ involutis prælo ſenſim Oleum exprime.

Eodem modo fiunt.

Olea Amygdalarum amararum.
Sem. Lini,
Papaveris albi &c.

Oleum Ovorum.

℞. *Ova recentia numero triginta aut plura.*

Coquito donec penitùs induruerint, ex his *Vitellos* exime, & comminutos in ſartagine igne mediocri aſſa, ſpatulâ aſſiduè movendo, donec rufeſcant, & pinguedinem quandam exudent: dein adhuc ferventes ſacculo cannabino aut pilis contexto excipiantur, & prælo committantur, ut *Oleum* effluat uſui reponendum.

Olea Simplicia per Infusionem & Decoctionem.

Oleum Rosatum.

℞. *Olei Olivarum non rancidi lib. X.*
Rosarum rubr. recent. non penitùs apertarum, leviter contusarum lib. IV.

Misceantur, insolentur, aut loco calido detineantur per *viginti dies*; dein coquantur lento igne, non tamen ad omnimodam humiditatis consumptionem, postcà fortiter exprimantur: expressum *Oleum* servetur.

Eo quo *Rosatum* modo, fiant & sequentia, eâ animadversione tamen adhibitâ, ut in coquendis *Herbarum calidarum Oleis*, earum *decoctum* addatur. Item quod *Oleum Rosatum*, *Cherinum*, *Violarum*, sola etiam insolatione fieri possint, vel saltem parùm bullire debeant, non autem referre, si ex *Herbis calidis Olea* diutiùs bullierint.

Oleum de Absynth. vulgari & recenti *Latifolij*,
Chamomelinum, ex floribus recentibus.
Liliorum alb. ex floribus abjecto luteo,
Nymphææ, ex flor. albis abjecto luteo,
Rutæ, ex herba virente,
Violarum, ex Violis recentibus.

Olea Composita per Infusionem & Decoctionem.

Oleum de Capparibus.

℞. *Corticum Radicum Capparum Unc. II.*
Cor-

Corticis mediani Tamarisci,
Fol. Tamarisci,
Sem. Agni casti,
Ceterach,
Rad. Cyperi an. Unc. ß.
Rutæ drach. II.
Aceti vini acerrimi,
Vini albi generosi an. Unc. IV.
Olei maturi lib. II.

Macerentur s. a. per biduum, deindè coquantur lento igne ad consumptionem vini & *aceti*, *Oleum* colatum reservetur ad usum.

Oleum de Castoreo.

℞. *Castorei,*
Styracis Calamitæ,
Galbani,
Euphorbii,
Cassiæ ligneæ,
Croci,
Opoponacis,
Carpobalsami, aut *Cubebarum*,
Spicæ Nardi Indicæ,
Costi an. drach. II.
Cyperi,
Schœnanthi,
Piperis longi,
nigri,
Sabinæ,
Pyrethri an. drach. II. ß.
Olei lib. III.
Vini Hispanici lib. II.

Confice sic, *Galbanum* & *Opopanacem* in

in *vino* ſeorſim diſſolve, deindè reliqua omnia contuſa cum *oleo* & *vino* coquito in duplici vaſe ad conſumptionem *vini*: Poſteà cola, ac diſſolutum & expreſſum *Galbanum* cum *Opoponace oleo* affunde, & iterùm coque ſufficienter, ac repone, ſæpiùs miſcendo impoſterum, ut *Galbanum* & *Opoponax* in vaſis fundo ſubſidentia *oleo* commiſceantur.

Oleum Catellorum.

℞. *Olei Olivarum lib. IV.*
Catellos nuper editos Num. II.
Vermium terreſtrium vino albo ſubmerſorum & lotorum lib. I.

Coctis *Catellis* ad oſſium compaginis diſſolutionem, adjiciantur *Vermes* & rurſùm coquantur ad humiditatis excrementitiæ evaporationem, expreſſioni adde
Terebinthinæ Cypriæ Unc. III.
Spiritûs vini Unc. I.

Et perficiatur ſ. a. *Oleum.*

Oleum Croci.

℞. *Croci Unc. ß.*
Myrrhæ electæ drach. II.
Aceti vini Unc. IV.
Cardamomi drach. IV. & ß.
Olei Unc. IX.

Crocum & *Myrrham* diebus quinque macera cum *aceto*, die ſexto *Cardamomum* ſeptimo cum *oleo* coquantur igne lento ad *aceti* conſumptionem.

Oleum

Oleum de Euphorbio.

℞. *Staphidis Agriæ,*
Saponariæ an. Unc. ß.
Pyrethri drach. VI.
Calaminthæ montanæ siccæ Unc. I. ß.
Costi drach. X.
Castorei drach. V.

Trita, triduoque macerata in *vini odo-riferi lib. I.* coquantur ad medias. Dein-dè frica multum diuque manibus, & co-la, & cum *Olei cheyrini lib. I. ß.* coque ad *vini* reliqui consumptionem: in hoc *oleo* solve.

Gummi Euphorbij electi & tenuissimè triti Unc. ß.

Factâ dissolutione calore leni, fiat co-latura, *Oleumque* servetur usui.

Oleum Hyperici compositum.

℞. *Summitatum & Florum Hyperici ad maturitatem seminis ferè accedentium lib. I.*
Olei veteris clari lib. II.
Vini odoriferi lib. I.

Macerentur tribus diebus ac noctibus, bulliant deindè in duplici vase, obturato orificio vasis ad *vini* consumptionem, po-steà exprimantur: *novas Summitates, Flo-res, & Vinum* in eodem *Oleo* macera, co-que & cola ut ante, idque tertiò fiat, tum forti expressioni adde

Terebinthinæ claræ lib. I.
Croci pulverisati scrup. IV.

Servetur ad usum.

Oleum Lumbricorum terreſtrium.

℞. *Lumbricorum terreſtrium vino albo ſub merſorum & lotorum lib. II.*
Olei Olivarum lib. IV.

Bulliant ad conſumptionem humidi tatis colentur & exprimantur.

Oleum Maſtichinum.

℞. *Olei Majoranæ lib. I.*
Maſtichis electæ groſſo modo contuſæ Unc. II

Sola diſſolutione *Maſtichis*, lentiſſim calore, ſine ulla ebullitione paretur præ ſtans *oleum*, quod colandum & ita ſer vandum.

Oleum Myrtillorum.

℞. *Baccar. Myrti ruditer contuſarum lib. ſ.*
Olei Omphacini lib. I. ß.
Vini rubri auſteri lib. ß.

Coquantur ad conſumptionem *vini* colentur & exprimantur.

Oleum Mucaginum.

℞. *Rad. Althææ recentium Unc. XX.*
Scyllæ recentis in mortario marmo reo contuſarum Unc. IV.
Sem. Fœnugræci,
Lini integrorum an. lib. I.

Macerentur in ſ. q. aquæ; deindè leniter coquantur donec remittant craſſam, & viſcoſam mucilaginem:

Cujus

Cujus per setaceum trajectæ lib. II.
Adde
Olei Anethini,
Chamæmelini,
Liliorum alborum an. Unc. XVI.
Coquantur simul ad humiditatis aqueæ :onsumptionem, subindè agitando ne ıdurantur.

Oleum Vulpinum.

℞. *Vulpem (qua fieri potest) pinguem, ætatis mediæ, venatuque circa Autumnum captam.*
Hanc occide, exentera, carnibusque ost detractam pellem in frusta dissectis, actisque singulis ossibus, adde
Vini albi, &
Aquæ fontis an. lib. X.
Salis marini Unc. III.
Summitatum Anethi,
Thymi,
Chamæpityos an. m. IV.
Coque diligenter despumando ad meas, mox fiat cum expressione colatura: ndemque recoque cum
Olei veteris optimi lib. IV.
Flor. Salviæ,
Rorismarini an. m. II.
Absumptâ demùm *aqueâ humiditate* coıtur denuò; *oleumque* ab omni aquositate mune servetur usui.

Olea per Destillationem.

Oleum Absynthii.

℞. *Absynthij sicci q. v.*

Maceretur *aquâ fontanâ Tartarisatâ* per quatuordecim dies, vel sine maceratione additâ *Salis communis s. q.* destilletur per *Vesicam*, & exibit *aqua* cum *oleo*, separetur *oleum* per infundibulum, vel vitrum separatorium dictum, & servetur ad usum.

Eodem modo extrahitur:

Oleum Herbarum Menthæ,
Rorismarini,
Rutæ,
Sabinæ,
Salviæ &c.
Florum Aurantiorum recentium,
Lavendulæ, &c.
Corticum Aurantiorum recentium,
Citri recentium, &c.

Qui *Cortices* ab alba parte interiori separentur, contundantur, macerentur, post modùm destillentur ut suprà.

Oleum Seminum Anisi.

℞. *Sem. Anisi contusorum lib. II.*
Aquæ fontanæ lib. XX.
Tartari albi crudi pulverisati Unc. II.

Macerentur per 24. horas, destillentu[r] per Vesicam, seu per Alembicum cum su[o] refrigeratorio. *Oleo* cum *aqua* extracto pe[r] infundibulum separato, *aquam* adhibe a[d] novam destillationem.

Eodem modo extrahitur:

Oleum ex sem. Anethi,
Carui,
Cumini,
Dauci,
Fœniculi, &c.
Ex Aromat. ut Cinnamomo,
Garyophyllis,
Macere,
Nuce Moschata, &c.
Ex lignis aromaticis, ut Sassafras,
Rhodio, &c.

Oleum ex Baccis Juniperi.

℞. *Baccarum Juniperi recentium lib. L.*

Contundantur & ponantur in vase terreo cum *aquæ frigidæ lib. XXIV.* & *fermenti acrioris lib. I.* Reponantur in cella (vase benè obturato) per tres menses; deindè distillentur per Alembicum, vel Vesicam cum aquæ simplicis convenienti quantitate. Post separationem *olei* per infundibulum, servetur aqua ad novam distillationem.

Eodem modo fit

Oleum ex Baccis Lauri,
Hederæ, &c.

Oleum Ceræ.

℞. *Ceræ flavæ q. v*

Liquefiat *Cera*, & *à carbonibus*, *lateribus*, vel *globulis argillaceis ignitis* imbibatur, qui indentur *Retortæ*, & extrahatur *oleum* in *arena*; quod cum copiosa aqua rectificetur.

Eodem modo destillari poterunt *olea* ex *Pinguedinibus*: nec non ex *Gummi* & *Resinis*, quæ in *pulveres* redigi non possunt. Ejusmodi sunt

Ammoniacum,
Caranna,
Opoponax,
Sagapenum,
Styrax liquida,
Tacamahaca, &c.

Oleum de Lateribus.

℞. *Lateres* aut *Tegulas rufas antiquissimas ex rufo luto ductas*, easque confringe in frusta mediocria, & in prunis urito, donec excanduerint. Deindè à prunis exempta fragmenta extinguantur *oleo claro veteri* illicò cooperiendo ne flammam contrahant, ac demittito, donec planè refrixerint, & *oleo* se impleverint, exempta terantur, pulverem hunc in Retortam ac Cucurbitam vitream luto Chymico lutatam indito, & jungatur Recipiens capax juncturis pariter luto obductis, ac per gradus ignis *oleum* elicito: quod prolectum in Phiala diligenter obturata recondatur.

Oleum Myrrhæ per deliquium.

Aliquot *Ovis* ad duritiem coctis, & per mediam longitudinem incisis, *Vitelli* eximantur: Tum albuminum cavitates *Myrrhâ tritâ* ad medietatem impleantur, & dentò

enuò conjungantur eorundem partes, loque leviter constringantur & suspen- antur in cella: ut sic *Myrrhæ liquatus umor* in fictile vel vitreum vas distillari ueat.

Oleum Terebinthinæ.

℞. *Terebinthinæ q. v.*

Destilletur per Vesicam affusâ aquæ opiâ.



CLAS-

CLASSIS DUODECIMA

De Unguentis.

Unguentum Ægyptiacum.

℞. *Æruginis subtiliter pulverisatæ Unc. V.*
Mellis Unc. XIV.
Aceti vini acerrimi Unc. VII.

Coquantur simul igne lento, donec fiat *Unguentum spissum & colore purpureum.*

Unguentum Album.

℞. *Olei Rosati Unc. IX.*
Cerussæ pulverisatæ Unc. VI.
Ceræ albæ Unc. II. ß.

Post liquefactam in *oleo Ceram*, tempestivè injice *Cerussam*, moveanturque continuò, donec inspissentur, & fiat *Unguentum.*

Camphoratum fiet, si *lib. I. Unguenti* addas *Camphoræ Oleo Rosato tritæ drach. I.*

Unguentum Althææ.

℞. *Olei Mucaginum lib. IV.*
Ceræ flavæ lib. I.
Resinæ puræ lib. ß.
Terebinthinæ Unc. II.
Pulv. rad. Curcumæ q. s. pro colore flavo.

Liquentur simul leni igne sine ullâ coctione, & colatum per linum, Unguentum servetur usui,

Unguentum Apostolorum.

℞. *Olei olivarum communis lib. II.*
Lithargyri auri drach. X.

Coque leni igne affusâ aquæpuræ f. q. spatulâ continuo agitando ad unguenti mollioris consistent. adde

Ceræ flavæ,
Resinæ an. drach. XIV.

Liquatis & adhuc tepentibus misce sequentia aceto acerrimo dissoluta, colata & ad mellis consist. cocta

Gummi Ammoniaci drach. XIV.
Bdellij drach. VI.
Galbani,
Opoponacis an. Unc. ß.

Miscendo his

Terebinthinæ drach. XIV.

Tandem injice pulveres sequent.

Aristolochiæ longæ,
Olibani an drach. VI.
Myrrhæ Unc. ß.
Æruginis drach. II.

F. s. a. Unguentum.

Unguentum de Arthanitâ.

℞. *Succi Cyclaminis lib. II.*
Fructuum & herbar. Cucumeris agrestis,
Butyri Vaccini an. lib. I.
Olei simplicis lib. II.
Pulpæ Colocynthidis Unc. IV.
Polypodij Unc. VI.
Euphorbij Unc. ß.

Contundenda terantur & macerentur in

Succis

Succis & Oleis per octiduum in vase vitreato probé obturato; posteà coquantur ferè ad consumptionem humiditatis, fiatque colatura & expressio fortis, in expresso *oleo* liquefac

Ceræ flavæ Unc. V.

Tum,

℞. *Gummi Sagapeni Unc. I.*
Myrrhæ pulverisatæ drach. III.

Solvantur in mortario calido pistillo calido cum q. s. *Aceti*, teranturque diligenter, donec grumi non appareant, ad formam mellis, his adde

Fellis Taurini ad mellis spissitudinem in Balneo cocti drach. VII.

Ac cum prædicto *oleo* in quo *Cera* fusa est probè misceantur, quibus continuò motis, insperge paulatim pulverem subsequentium medicamentorum,

Scammonij,
Aloës,
Colocynthidis,
Mezeræonis,
Turbith an. drach. VII. & ß.
Salis Gemmæ drach. IV. & ß.
Euphorbij,
Piperis longi,
Zinziberis,
Chamæmeli an. drach. III.

Fiatque *Unguentum* s. a.

Unguentum Aureum.

℞. *Olei veteris & clari lib. II.*
Ceræ Citrinæ lib. ß.

Tere-

Terebinthinæ Unc. II.
Resinæ Pineæ,
Colophoniæ an. Unc. I. ß.
Thuris,
Mastiches an. Unc. I.
Croci optimi triti drach. I.

Liquefiant in *Oleo*, *Cera*, *Terebinthina*, *Resina*, *Colophonia:* defervescentibus addantur *pulveres Thuris & Mastiches*, *Crocus* ultimò inspergatur, & rudicula diligenter misceatur, fiatque *Unguentum*.

Unguentum Basilicon.

℞. *Picis Navalis,*
Resinæ Pini,
Sevi Vaccini,
Ceræ Citrinæ an. lib. I.
Olei communis lib. II.

Liquata commisceantur, & f. s. a. *Unguentum.*

Unguentum Enulatum cum Mercurio.

℞. *Pulpæ radicum Enulæ campanæ ex aquâ communi coctæ lib. I.*
Pulpæ radicum Oxylapathi, eodem modo coctæ lib. ß.

Misceantur, & superaffunde
Aceti vini Unc. IV.

Recoquantur ad humiditatis evaporationem; dein sume
Axungiæ Porcinæ veteris,
Olei veteris an. Unc. IV.
Terebinthinæ decocto præscriptarum radicum lotæ Unc. III.

Ceræ

Ceræ flavæ Unc. I.
Salis communis optimè triti,
Aluminis an. Unc. ß.
Pulv. Rad. Hellebori albi,
nigri an. drach. II.
Hydrargyri succo Limon. extincti Unc. II.

Axungiæ, *Ceræ*, & *Oleo* liquefactis, adde *Pulpas Enulæ* & *Oxylapathi*, *Salemque* & *alios pulveres immisce*, ultimò *Hydrargyrium* non solùm *succo Limonum*, sed etiam *totâ Terebinthinâ* ad hoc asservatâ, & *Axungiæ* parte in mortario lapideo indefessa agitatione extinctum.

Paretur cum & sine Mercurio.

Unguentum de Glycyrrhiza.

℞. *Glycyrrhizæ recentis ac succulentæ Unc. II.*
Butyri recentis aquâ Rosarum & Solatri aliquoties loti lib. ß.

Pistentur simul in mortario; posteà frigantur in sartagine, colentur & exprimantur, hocque tertiò iteretur, reassumptâ semper novâ *Glycyrrhizâ*: tunc sume

Cerussæ mundissimæ pulverisatæ Unc. I. ß. quæ cum Aceti distillati Unc. VI. coquatur ad pultis formam, & Butyro jam præparato commixta diu multumque agitetur.

His adde

Pompholygos drach. II.
Albuminis Ovi conquassati, & in liquorem aquæ instar resoluti drach. VI.
Camphoræ oleo Amygdalarum tritæ scr. I.

Fiat s. a. Unguentum.

Unguentum Martiatum.

℞. *Herb. Absinthij,*
Abrotani,
Basilici,
Calaminthæ,
Centaur. min.
Chamædryos,
Costi Hortensis,
Majoranæ,
Menthæ aquat.
Sabinæ,
Salviæ,
Sambuci an. Unc. I. ß.
Fol. Lauri,
Rorismarini,
Ruthæ an. Unc. III.
Sem. Cumini,
Fœnugræci,
Urticæ maj. an. Unc. ß.

Omnia minutim incisa & contusa coquantur cum Axungiæ porcinæ lib. IV.

Expressis & ab humiditate separatis adde
Olei Nucis Moschatæ expressæ &
Tessellatim incisi Unc. I.

Ac ubi ab igne refrixerint
Styracis liquidæ Unc. III.

F. s. a. Unguentum.

Unguentum Neapolitanum.

℞. *Axungiæ Suillæ recentis non salitæ, à membranis probè purgatæ lib. I.*
Succi Salviæ Unc. IV.

Bulliant simul lento igne ad *succi* consump-

ſumptionem, in colatura liqueſac

Ceræ flavæ,
Olei Laurini an. Unc. I.

His ab igne ſemotis & frigefactis immiſce exactiſſimè in mortario

Mercurij crudi Unc. IV.
Styracis liquidæ, cum Unc. I. Terebinthinæ ſolutæ, Unc. ß.
Olei Guajaci drach. II.

Fiat ex arte Unguentum.

Unguentum Nervinum.

℞. *Herb. recent. Salviæ,*
Ivæ Arthetica,
Majoranæ,
Roriſmarini,
Menthæ,
Ruthæ,
Paralyſeos cum flore,
Flor. recent. Lavendulæ,
Hyperici,
Chamomillæ,
Meliloti,
Summitatum Anethi recentium an. m. I.
Baccarum Lauri,
Juniperi an. Unc. I.
Radicum Pyrethri drach. II.

Inciſa & contuſa, immergantur in

Oleorum Lumbricorum,
Vulpini,
Anethini,
Hyperici an. Unc. III.
Terebinthinæ Unc. I.

Axun-

Axungiæ Humanæ,
Cati ſylveſtris,
Canis an. Unc. ß.

Macerentur per ſeptimanam unam vel alteram, poſteà in Cucurbita ſemel atque iterum ebulliant, exiguâ, quæ prodiit, humiditate *herbis* & *oleis* reaffuſâ: tum fortiter exprimantur & colentur, in *expreſſo ac colato* diſſolve

Maſtichis optimè pulveriſatæ Unc. ß.
Terebinthinæ Unc. IV.
Ceræ Unc. III.
Benzoini in unciis duabus Spiritûs vini rectificatiſſimi diſſoluti drach. VI.

Et conficiatur Unguentum.

Unguentum Nutritum.

℞. *Lithargyri auri tenuiſſime lævigati lib. ß.*
Olei Olivarum lib. II.
Aceti vini q. ſ. ad nutriendum in mortario.

F. ſ. a. Unguentum.

Unguentum Populeon.

℞. *Oculorum Populi arboris recentium & contuſorum lib. III.*
Axungiæ Porcinæ recentis fuſæ & colatæ lib. VI.

Mixta ſimul macerentur, donec *Herbæ* [ſe]*quentes* ſub initium æſtatis colligi poſſint. [T]unc,

℞. *Fol. Bardanæ,*
Hyoſciami,
Lactucæ,
Mandragoræ,
Papaveris nigri,

Sedi

Sedi majoris,
minoris,
Solani,
Umbilici Veneris, ejus loco *Craſſulæ*
Cymarum Rubi teneriorum an. m. V

Contuſa omnia commiſceantur *Axungiæ* & *oculis Populi*: poſt aliquot dies adde
Succi Solatri, lib. I.

Coquantur ad humiditatis conſumptionem; colentur & exprimantur.

Poſt annum invalidum redditur hoc Unguentum, aut contrariarum virium; eò quod facile ranceſcat.

Unguentum Roſatum.

℞. *Axungiæ Porcinæ recentis purgatæ & candidæ q. v.*

Cui admiſce
Roſarum recentium mundatarum & modicè in pilâ lapideâ contuſarum quantùm Axungia capere poteſt.

Macerentur per aliquot dies; tum colliquentur & exprimantur: addendo denuò *Roſas recentes*, hocque tertiò. In fine decoquantur ad humiditatis conſumptionem, etiam affundendo
Aquæ Roſarum lib. I.

Poſt refrigerationem ducatur pars venditioni exponenda piſtillo ligneo in vaſe marmoreo, ſuperaffusâ *aquâ Roſaceâ* & *Unguentum* erit gratioſum & candidum.

Bal-

Balsamum Arcæi.

℞. *Terebinthinæ Venetæ,*
Gummi Elemi an. Unc. I. ß.
Sevi Castrati Unc. II.
Axungiæ Porcinæ veteris, & insulsæ Unc. I.
Ex omnibus simul liquatis & colatis, fiat ex arte Unguentum.

Balsamum Lucatelli.

℞. *Olei Olivarum optimi lib. III.*
Terebinthinæ in aqua rosar. lotæ Unc. VIII
Ceræ lib. I.
Santali rubri pulveris. Unc. II.
Vini Hispanici q. s.
Coque s. a. addendo circa finem
Balsami Peruviani Unc. I.

Balsamum Viride.

℞. *Ol. Olivar.*
Lini an. Unc. IV.
Laurini Unc. ß.
Juniper. drach. II.
Garyopill. drach. ß.
Aloës, drach. I.
Terebint. Venet. Unc. I.
Virid. eris drach. II.
Vitriol. albi scrup. IV.
F. s. a. Balsamum.



CLASSIS DECIMA-TERTIA.

De Ceratis & Emplastris.

Ceratum de Crusta panis.

℞. *Crustæ panis tostæ, & in Aceto macera-tæ Unc. II.*
Oleorum Mastichini,
Cydoniorum an. Unc. I.
Pulveris Mastiches,
Menthæ,
Spodij,
Coralli rubri,
Santali albi,
rubri an. drach. I.
Farinæ Hordei quantùm sufficit.
Fiat *Ceratum*, semper recens præparandum.

Ceratum defensivum.

℞. *Olei Rosati,*
Aceti Rosati an. Unc. VI.
Bulliant simul continuò agitando ad consumptionem *Aceti*, & in *Oleo* liquentur *Ceræ albæ Unc. VI.* quibus tepidis immisce sequentia pulverisata:
Boli Armeni,
Terræ sigillatæ an. Unc. II.
Sanguinis Draconis Unc. I.
Balaustiorum Unc. ß.
Et f. s. a. Ceratum.

Em-

Ceratum Matricale.

℞. *Galbani Aceto soluti & cocti Unc. I. ß.*
Tacamahacæ,
Assæ fœtidæ an. Unc. ß.
Myrrhæ rubræ drach. II.
Pulveris Matricariæ,
Arthemisiæ an. drach. ß.
Bdellij mollis drach. I.
Pulveris Lapidis magnetis scrup. IV.
Seminis Dauci Cretici scrup. I.
Olei Succini guttulas aliquot.

In *Vino albo Gummata* dissolvantur, & additâ *Ceræ* sufficienti quantitate, f. s. a. *Ceratum.*

Ceratum Santalinum.

℞. *Rosarum rubrarum drach. XII.*
Santali rubri drach. X.
albi,
citrini an. drach. VI.
Ceræ albæ drach. XXX.
Eboris drach. VII.
Camphoræ drach. II.
Olei Rosati lib. I.

Misce, & f. s. a. *Ceratum.*

Ceratum Stomachicum.

℞. *Mastiches Unc. ß.*
Tacamahacæ,
Ladani an. drach. II.
Balsami Indici veri drach. I.
Terebinthinæ Venetæ,
Ceræ albæ an. q. s.

Misce, & f. s. a. Ceratum.

DE EMPLASTRIS

Emplaſtrum album coctum.

℞. *Olei Olivar.*
Ceruſſæ an. lib. I.
Aquæ fontis q. ſ.
Coque ad Emplaſt. conſiſt. addendo
Ceræ albæ Unc. II.
Miſce f. Emplaſtrum.

Emplaſtrum de Baccis Lauri.

℞. *Baccarum Lauri mundatarum Unc. II.*
Thuris,
Maſtiches,
Myrrhæ an. Unc. I.
Olei Laurini drach. VI.
Terebinthinæ parùm coctæ Unc. I. ß.
Cyperi,
Coſti an. Unc. I.
Foliorum Rutæ ſiccorum drach. III.
Sem. Cumini,
Fœniculi an. drach. II.
Mellis deſpumati quantùm ſatis.
Miſce, & f. ſ. a. Emplaſtrum.

Emplaſtrum de Betonicâ.

℞. *Herb. Betonicæ,*
Plantaginis,
Apij,
Verbenæ,
Pimpinell. an. m. ß.
Inciſ. & contuſis coque leniter cum

Ceræ flavæ Unc. IV.
Resinæ Pini lib. ß.
Colophon. Unc. ß.
Colat. Expreſſ. adde
Terebinth.
Gummi Elemi an. Unc. IV.
Maſtich. drach. ß.
F. ſ. a. Emplaſtrum.

Emplaſtrum Carminativum.

℞. *Gummi Galbani,*
Bdellij,
Ammon. an. Unc. ß.
Thuris maſculi,
Myrrhæ rubræ an. drach. II.
Opij Thebaici drach. I.
Diſſolve in Aceto Scyllitico iterumque inſpiſſatis adde
Ceræ citrinæ,
Colophoniæ an. drach. III.
Balſami Peruv.
Ol. Philoſoph. an. drach. I.
Terræ drach. ß.
Carui ſtillat. ſcrup. ß.
Terebint. Venet. q. ſ.
F. ſ. a. Emplaſtrum.

Emplaſtrum Althææ.

℞. *Rad. Althææ pulveris lib. ß.*
Olei Camomillæ,
Anethini an. Unc. II.
Roſarum,
Adipis anatis an. Unc. I.
Olei Liliorum albor. drach. X.

Emplast. Diachyl. cum gum. Unc. III. ß
Medullæ Vituli,
Vaccæ an. drach. VI.
Adipis Vaccæ Unc. III.
Ceræ flavæ Unc. IX.
F. s. a. Emplastrum.

Emplastrum de Cicutâ.

℞. *Cicutæ recentis parum contus. q. s.*
Sevi Ariet.
Resinæ,
Resinæ Pini an. Unc. IX.
Ceræ citrinæ Unc. VI.
Coq. simul ad humid. consumpt. colat. fortiter expressæ adde
Gummi Ammoniaci,
Terebint. Venetæ an. Unc. IV.
F. s. a. Emplastrum.

Emplastrum Dia-Palma.

℞. *Litargirij auri,*
Olei Olivarum an. lib. III.
Axungiæ Porci lib. II.
Aquæ communis in quâ Salis comm. Unc. I. soluta est q. s.
Coque s. a. continuò spatulâ palmeâ agitando donec digitis non adhæreant adde
Vitrioli albi Unc. IV.
Misce fiat *Emplastrum.*

Emplastrum Dia-chylon simplex.

℞. *Olei Mucaginum lib. III.*
Lithargyri auri lib. I. ß.
F. s. a. Emplastrum.

Emplastrum Dia-chylon cum gummis.

℞. *Olei Mucaginum lib. VIII.*
Lithargyri auri lib. IV.
Ceræ,
Terebinthinæ an. lib. ß.
Ammoniaci,
Galbani,
Opoponacis,
Sagapeni an. Unc. IV.
F. s. a. Emplastrum.

Emplastrum Dia-phoreticum.

℞. *Gummi Ammoniaci Unc. II.*
Elemi Unc. I. ß.
Sagapeni Unc. I.
Solvantur in s. q. *Aceti* ad pultis formam, cui adde pedetentim & quasi guttatim
Ceræ flavæ odoratæ lib. I.
Terebinthinæ claræ Unc. III.
Colophoniæ, seu *Picis Græcæ Unc. IV.*
Liquata invicem leni igne, in Sartagine separatim, & non nimis calidè superioribus *Gummatibus* sensim & alternatim, uti dictum, sub continuâ agitatione infusa; hinc alternatim etiam inspergantur successive hi pulveres: utpote
Pulveris Gummi Bdellij Unc. IV.
Succini Citrini Unc. III.
Olibani,
Mastiches an. Unc. I.
Sandaracis drach. VI.
Post agitentur, donec omnia commixta, atque dextrè unita sint, per horam inte-

gram in diplomate, vase scilicet duplici calore leni: fiatque Emplastrum.

Emplastrum Dia-pompholygos.

℞. *Olei Rosarum cum succo Solatri cocti & præparati Unc. X.*
Ceræ albæ Unc. VIII.

Liquescant lento igne, remotis ab igne insperge pulveres sequentes:

Pompholygis præparatæ,
Tutiæ præpar.
Plumbi usti & loti an. Unc. II.
Cerussæ lotæ Unc. IV.
Thuris masculi Unc. I.

Moveantur continuò ad refrigerationem, & f. s. a. Emplastrum.

Emplastrum Divinum *seu* Manus Dei.

℞. *Olei Olivar. lib. I.*
Lithargyri aurei lib. ß.
Aquæ comm. q. s.

Coque ad consistentiam Emplastri cui adde

Ceræ flavæ Unc. IV.
Gummi Ammoniaci,
Galbani colat. & inspiss. an. Unc. I.
Terebint. Unc. I. ß.
Olei Laurini drach. VI.

Tum insperge pulveres sequentes

Myrrhæ,
Mastiches,
Olibani an. Unc. I.
Lapid. Calamin.
Magnetis,

Rad. Aristoloch. longæ,
rotundæ,
Viridis æris an. Unc. ß.
Misce f. s. a. Emplastrum.

Emplastrum Epispasticum.

℞. *Ceræ citrinæ Unc. I.*
Terebinth. Unc. II. in æstate *Unc. I. ß.*
Picis albæ Unc. I.
Cantharid. pulveris. Unc. II.
F. s. a. Emplastrum.

Emplastrum Filii Zachariæ.

℞. *Ceræ flavæ,*
Medullæ cruris Vaccæ,
Adipis Anatis,
Gallinæ,
Mucilaginis sem. Lini,
Althææ,
Fœnugræci an. lib. I.
Olei Lini q. s.
Fiat Emplastrum.

Emplastrum de Galbano.

℞. *Galbani in Aceto dissoluti Unc. I.*
Picis navalis Unc. ß.
Emplastri Dia-chylonis simplicis drach. II.
Salis Armoniaci scrup. II.
Misce, & fiat Emplastrum.

Emplastrum Gratia Dei.

℞. *Ceræ,*
Resinæ an. lib. I. ß.

Tere-

Terebinthinæ Unc. X.

Mixta ſimul liquefiant & paululum refrigeſcant, tunc adde

Olibani pulveriſati Unc. VI.

Miſce, & cum *Oleo Roſaceo* fiant *Magdaleones.*

Emplaſtrum Gryſeum *ſeu* de Lapide Calaminari.

℞. *Lapidis Calaminaris uſti, & Aceto vini extincti, & ſuprà Porphyritem præparati Unc. I.*
Litargyrij auri Unc. II.
Ceruſſæ Unc. ß.
Tutiæ præparatæ drach. III.
Terebinthinæ drach. VI.
Ceræ albæ Unc. I. ß.
Sevi Cervini Unc. II.
Thuris electi drach. V.
Maſtiches drach. III.
Myrrhæ drach. II.
Camphoræ drach. I. ß.

Confice ſ. a. Emplaſtrum.

Emplaſtrum ad fracturas Oſſium.

℞. *Rad. & Fol. Conſolidæ maj. m. II.*
Althææ,
Bacc. Mirthi an. Unc. ß.
Fol. Hyperic.
Salicis an. m. I.

Coq. in ſ. q. aquæ Chalyb. ad lib. I.

Colat. fortiter expreſſæ & Mucilaginoſ tum adde

Se

Sevi Hircini,
Olei Rosarum,
Myrtillor. an. lib. ß.
Quibus liquatis adde
Lythargirij auri lib. ß.
Minij Unc. II.
Coque ad consistentiam Emplastri tenuioris tum in eo liquef.
Ceræ flavæ Unc. IV.
Terebinth. Unc. II.
Addendo pulveres sequentes
Boli Armeni,
Terræ sigillatæ,
Olibani,
Mirrhæ,
Mastichis an. Unc. I. ß.
Sanguinis Draconis Unc. I.
F. s. a. Emplastrum.

Emplastrum Magneticum Arsenicale.

℞. *Gummi Sagapeni,*
Ammoniaci,
Galbani an. Unc. III.
Ceræ,
Therebint. an. Unc. IV. ß.
Magnetis Arsenicalis Unc. III.
Terræ Vitrioli lotæ Unc. I.
Olei Succini Unc. II.
Misce f. s. a. Emplastrum.

Magnetem Arsenicalem sic conficies
℞. *Antimonij crudi,*
Sulphuris flavi,
Arsenici Crystallini an. Unc. II.

Pulve-

Pulverif. omnia fubtiliter, & in vafe vitreo in arenam calentem imponantur, & tamdiu in illa reliquantur donec materia ifta omnis colliquefcat id quod inde cognoveris fi materies ftylo ferreo tacta illi adhærefcat & *Terebinthinæ* inftar ductitetur colore eft rubea, fub obfcura poftea infrigidatur: deinde rupto urinali eximitur materia quæ in unam maffam concurrit & dura eft inftar picis.

Emplaftrum de Meliloto.

℞, *Meliloti Unc. VI.*
Florum Camomillæ,
Comarum Abfinthÿ,
Sampfuchi, id eft, *Majoranæ,*
Baccarum Lauri,
Radicis Althææ an. drach. III.
Sem. Apÿ,
Ameos,
Cardamomi,
Ireos,
Cyperi,
Spicæ,
Caffiæ ligneæ an. drach. I. ß.
Ammoniaci drach. X.
Styracis Calamitæ,
Bdellÿ an. drach. V.
Terebinthinæ Unc. I. ß.
Ficus pingues coctos, & cribratos N. XII.
Sevi Caprini,
Refinæ an. Unc. II. ß.
Ceræ Unc. VI.

Olei

Olei Sampsuchini,
de Spica an. Unc. I.
Decoctionis Meliloti, Camæmeli & Fœnugræci q. s.

Misce, & fiat Emplastrum. Parandi sunt *Magdaleones* crassi, ne exsiccentur.

Emplastrum de Mucilaginibus.

℞. *Mucaginum sem. Althææ,*
Lini,
Fœnugræci,
Corticis Mediani Ulmi an. Unc. IV.
Oleorum Camæmelini,
Liliorum,
Anethini an. Unc. I. ß.
Ceræ Citrinæ Unc. XX.
Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Sagapeni,
Opopanacis Aceto solut. an. dr. VI
Terebinthinæ Gummis colatis mixtæ Unc. II. ß.
Croci drach. II.

Et f. s. a. Emplastrum.

Emplastrum Oxycroceum.

℞. *Colophoniæ,*
Picis nigræ,
Ceræ flavæ an. lib. ß.

Liquescant simul lento igne, & ab igne abductis immisce diligenter,
Ammoniaci,
Galbani, Aceto maceratorum, coctorum,
&

& ad mellis consist. evapor. an. Unc. II.
Terebinthinæ Gummatibus prædictis immixtæ Unc. III.

Posteà insperge sequentia tenuissimè pulverata:

Croci Unc. I.
Olibani,
Mastiches,
Myrrhæ an. Unc. II.
F. s. a. Emplastrum.

Emplastrum Stipticum paracelsi.

℞. *Minij,*
Lapidis Calaminaris an. Unc. I.
Lithargyri auri,
argenti an. Unc. II.
Olei Lini Unc. III.
Olivarum Unc. IV.
Laurini,
Juniperi, an. drach. II.
Ceræ,
Colophoniæ an. Unc. II.
Gummi Opoponacis,
Galbani,
Sagapeni,
Ammoniaci, an. Unc. ß.
Vernicis, seu *Sandaracis,*
Terebinthinæ an. Unc. I.
Bdellij Unc. ß.
Carabes Citrinæ,
Olibani,
Myrrhæ Alexandrinæ,
Aloës Epaticæ,
Aristolochiæ longæ,
rotundæ an. drach. I. ß.

Mumiæ Transmarinæ,
Magnetis Oleo Martis præparati,
Hæmatites an. drach. II.
Coralli rubri,
albi,
Matris perlarum,
Sanguinis Draconis,
Terræ sigillatæ,
Vitrioli albi an. drach. I. ß.
Florum Antimonij,
Croci Martis adstringentis an. scrup. II.
Camphoræ drach. I. ß.
Misce & f. s. a. Emplastrum

Emplastrum Vigonium, *seu* de Ranis cum Mercurio.

℞. *Ranas aquaticas viventes N. VI.*
Lumbricorum terrestrium vino albo lotorum & submersorum Unc. III. ß.
Vini albi lib. II.
Infundantur simul per aliquot horas, tum bulliant igne moderato ad tertiæ partis consumptionem, addendo sub finem
Matricariæ cum floribus,
Schœnanti,
Stœchados Arabicæ ana m. I.
Posteà adjice
Olei Camæmelini,
Anethini,
Liliorum alborum an. Unc. II.
Axungiæ Porci lib. I.
Pinguedinis Vitulinæ lib. ß.
Bulliant rursùs omnia ad vini tertias, cola-

colaturæ fortiter expreſſæ adde

Succ. Radicum Ebuli,

Helenij an. Unc. II.

Quibus mixtis, & ſenſim affuſis, nutriantur

Litargyrij auri tenuiſſimè triti lib. I.

Et coquantur ſimul lento igne, donec eam conſiſtentiam acquirant, ut digitis non adhæreant, tum adjice, ut liqueſcant,

Ceræ Citrinæ Unc. VI.

Axungiæ Viperinæ (ſi deſit) *Taxi Unc. II. ß.*

Olei Laurini Unc. I. ß.

His ab igne ſemotis & tepidis, adde

Olei de Spica Unc. II.

Olei Crocini ſup. Claſſe XI. deſcripti Unc. I

Olibani pulveriſati drach. X.

Euphorbij pulveriſati drach. V.

Poſtremò immiſce

Terebinthinæ claræ Unc. II.

Styracis liquidæ Unc. I. ß.

Hydrargyrij Terebinthinâ extincti, & Styraci prædictæ immixti Unc. IV.

Miſce, & fiat ex arte Emplaſtrum, quod cum & ſine Mercurio à Pharmacopœo reſervari debet.

Spannadrapium ad Fonticulos.

℞. *Emplaſtri Palmei,*

Dia-chylonis ſimplicis.

de Ceruſſâ coctâ,

Ceræ an. lib. I.

Cinnabaris,

Pal-

Pulveris Ireos subtilissimi an. Unc. IV.
Moschi Olei Amygdalarum soluti gr. VIII.
Fundantur & misceantur s. a. imbibe
elis pro Spannadrapio.

Spannadrapium Marchionis d'Este.

t. Olei Olivarum,
Litargyrij auri an. lib. ß.
Coquantur ad nigredinem, & adde
Ceræ flavæ,
Picis nigræ,
Emplastri Dia-chalciteos an. lib. ß.
Omnia probè misceantur, iisque adhuc
alentibus tela tenuis immergatur, & f. s. a.
pannadrapium.





CLASSIS DECIMA-QUARTA

De Præparationibus ſimplicium Medicamentorum uſualium.

PRæparata officinarum communiter, & in ſpecie ſic dicta, nihil aliud ſunt quàm ſimplicia nonnulla duriuſcula in tenuiſſimum pulverem, accedente aliqu aquâ cordiali, redacta talia ſunt: *Terræ Lapides*, *Perlæ*, *Corallia*, *Cruſtacea* ſe *Teſtacea.*

Modus præparandi.

Rem præparandam lævigа ſuper Porphyrite lapide verſatili quàm minutiſſimè inter lævigandum aſperge aquam aliquam Cordialem (*Puta Roſarum*, *Borraginis Meliſſæ* & ſimilium) ut fiat inſtar *Pultis* hanc expone loco tepido, vel aëri, ut i umbrâ exſiccetur.

Nota. Quæ ſolidiora & duriora, adcò que minùs lævigabilia ſunt, uſtione ante greſsâ calcinari, friabiliaque reddi ſolent ut *Cornua*, *Oſſa*, *Cruſtacea* & ſimilia.

Uſitatiora ſunt

Præparationes *Cinnabaris*,
Conchæ,

Cora

Corallorum alborum,
rubrorum,
Cornu Cervi usti,
Chel. Cancror.
Crystalli,
Granati,
Hæmatitis,
Hyacinthi,
Lapidis Armeni,
Calaminaris,
Judaici,
Lazuli,
Magnetis,
Margaritarum,
Matris Perlarum,
Oculorum Cancri,
Ovorum Struthij,
Saphyri,
Smaragdi,
Spodij,
Tutiæ,

Nota. Quod ad confectionem Alkermes *apis Lazuli* uratur in crucibulo postea ut pra terendo & lævigando in tenuissimum ilverem redigatur.

Aluminis ustio.

Aluminis Rochæ quantùm volueris.
Indatur vasi figulino non vitreato, & ne circumquaque accenso, aduratur do-c ampullas ampliùs non emittat.

Butyri Majalis præparatio.

℞. *Butyri inſulſi ſub menſis Maij finem confecti q. v.*

Indatur vaſi terreo vitreato, & Balne vel Solis calore liqueſcat: ſupernatans Bu tyrum per inclinationem ſeparetur à ser ſubſidente; & Colatum, idoneo loco ſin ſale recondatur, in annuum uſum.

Cochlearum Teſtarum præparatio.

℞. *Cochlearum oblongas Teſtas*, quæ prop piſcinas & lacus reperiuntur, his affund *Acetum diſtillatum*, ſtent in infuſione pe noctem ad extrahendum mucorem, quer diligenter abrades, poſteà pulveriſa, & cum aqua *Cardui Benedicti* in marmor præpara: volatilis enim illarum cinis pe calcinationem aliàs factus nullius eſt pre tii, nec operationis in uſu.

Cornu Cervini ſpagyrica præparatio

Calcinatio hæc commodè in Veſica per ficitur coctione continuâ mediante diſtil latione aquarum *Acetoſæ*, *Cardui Bene dicti*, *Calendulæ*, *Scorzoneræ* & ſimilium per cujus vaporem *Apices Cornu* in coll Alembici quâ parte attingi & penetrar queant, ſuſpenſi, jucundo & miro mod ad perfectam albedinem abſque flammi violentis vires aliàs exurentibus (ut in vul gari calcinatione fieri ſolet) molleſcan

calcinentur secundùm artem, & serventur ad usum.

Millepedum præparatio.

℞. *Millepedum vivorum q. v.*

Diligenter à sordibus purgentur deinde *spiritu vini dephlegmato* inebrientur, & calore moderato siccentur.

Opii Correctio præparatio.

Opium frustulatim & in teneras lamellas conscissum collocetur supra laminam ferream, quam super carbones accensos leniter incalescere, & *Opij sulphur Narcoticum* sensim exhalare sine, quousque non ampliùs fumum vel vaporem emittat, cavendo tamen ne comburatur; sed ut solummodò torrefiat, & hæc facilis est & compendiosa, genuina tamen *Opij* præparatio.

Plumbi ustio.

℞. *Plumbi q. v.*

Liquescat in fictili novo & injice *Sulphuris pulverisati* q. s. ignem succendito flagrans plumbum spatulâ ferreâ versetur donec prorsùs in cineres redigatur.

Scammonii præparatio.

Scammonium super cartam bibulam ex-

panſum fumo ſulphuris ſuffumigetur, id
ſtudioſe cavendo ne liqueſcat ſed lentiſſi
mo calore fumo ſulphuris imbuatur.

Tuthiæ præparatio.

℞. *Tutiæ officinarum*, ſeu *Cadmiæ Græ corum quantùm volueris.*

Ter ſaltem in Crucibulo candefacta, te
aquâ Roſarum & *Plantaginis* exſtinguatur
deindè ſuper marmor in ſubtiliſſimum pol
linem lævigata, cum *aquâ Plantaginis* &
Roſaceâ redigatur in paſtillos.

Plures aliorum ſimplicium utpote *Ra
dicum ſeminum* & ſimilium præparatione
variis in diſpenſatoriis reperiuntur quo
rum nonnullas, tamquam inutiles & no
neceſſarias refutamus nonnullas vero Me
dicorum judicio & præſcriptioni relinqui
mus.



CLASSIS DECIMA-QUINTA.

De quibusdam Medicamentis spagyricis.

Crocus Martis adſtringens.

℞. *Limaturæ Chalybis benè depuratæ tenuioris lib. ß.*

Extende ſuper Tegulam latam & planam, exponendam igni *Figulino*, aut *Reverberij*, ſpacio octo vel decem dierum, ſic ut Tegula à flammâ continuâ, continuò ardeat, & limatura reducetur in pulverem inpalpabilem, ſpongioſum, ſubruheum, uſui reponendum.

Crocus Martis cum Sulphure præparatus.

℞. *Sulphuris Magdaleon* applica ignito *Chalybis Bacillo*, ut candentes & liqueſcentes guttæ in ſubjectam pelvim aquâ frigidâ plenam incidant: repete illum laborem ad *Chalybis* totalem fuſionem, decanta poſteà aquam, & igniatur repertus pulvis in Crucibulo, reverberandus ad *Sulphuris* conſumptionem, & uſui, dum refrixerit, reponendus.

Magisterium Martis aperitivum.

℞. *Succi Oxalydis recenter expressi & per subsidentiam depurati lib. VIII.*
Pulpæ Tamarindor. pinguium Unc. XVI.

Confricentur manibus, vel pistillo ligneo in patina terrea, non stannea, & fiat instar *Pulmenti*, posteà coquatur parùm, & clarificetur per laneum pannum, clarificatum indetur Cucurbitæ vitreæ, cui adde *Limaturæ Chalybis à sordibus benè purgatæ Unc. VIII.* digerantur in arena loco calido per quatuor vel quinque dies & noctes, Cucurbitæ superponatur Alembicus cæcus, ut materia per intervalla agitari possit spatulâ ligneâ, per digestionem coletur per chartam emporeticam in patinam vitream vel terream, deindè inspissetur lento igne ad consistentiam Extracti liquidioris. Residuum *Chalybis* in subtilissimum pulverem redactum, exsiccetur & usui servetur.

Tinctura Martis aperitiva.

℞. *Limaturæ Chalybis per ablutionem purificatæ lib. ß.*
Tartari albi Germanici Crystallini præparati & pulverisati lib. II.

Misce exactè, & inde ollæ ferreæ valdè capaci & magnæ, addendo *Aquæ pluvialis purissimæ lib. XXIV.* (observando, ollam ultrà medietatem non esse replendam, alioquin materia, quæ bulliendo intumescit &

& inflatur, majori ex parte parietes ollæ transiliret) bulliant omnia benè per integrum diem, addendo per intervalla aquam bullientem (quæ in defectu præcedentis, semper debet esse ad manum) commoveatur continuò materia, quæ alioquin semper albicans apparebit. Post duodecim horarum ebullitionem, quod crassius est, subsidebit, subtilius verò supernatabit nigricantem præ se ferens colorem saporis dulcacidi: decanta quod clarum erit, filtretur, & in vase terreo vitreato evaporetur lento igne ad consistentiam Syrupi liquidioris.

Vitriolum Martis.

℞. *Spiritûs Vitrioli rectificati lib. III.*
Aquæ pluvialis lib. IX.
Misce, tum accipe
Limaturæ Chalybis purissimæ lib. I.

Projice *Limaturam* in Matracium vitreum amplum, & pedetentim superaffunde tres partes superioris mixturæ, *Spiritûs* & *Aquæ* scilicet. Digerantur super cineres calidos per tres dies; tum liquorem viridem per declinationem decanta in alio vitro, & si ex *Limatura* quidquam indissolutum restitet, illi reliquam partem dissolventis adde, & digere super cineres, ut dictum est: deindè decanta, & junge primæ dissolutioni, rejiciantur verò fæces tamquam inutiles. Filtrentur omnes dissolutiones, & evaporentur in vase vitreo igne len-

lento, ad consumptionem medietatis, deindè ponantur in cellâ vinariâ, vel loco frigido per tres dies, tum collige *Crystallos Vitrioli*, reliquam humiditatem decanta, evapora, & crystallisa, ut supra. Postea exsicca *Crystallos*, & usui serva in vitro benè obturato.

Saccharum Saturni.

℞. *Cerussæ optimæ q.v.* (Belgicè Schelp-wit)

Huic subtilissime pulverisatæ affunde Acetum stillatitium ad supereminentiam trium vel quatuor digitorum transversorum: stent in digestione donec Acetum dulce factum fuerit: dein Aceti decantati levi igne fiat evaporatio ad cuticulæ apparentiam sic in loco frigido concrescent Crystalli in umbra exsiccandi: reliquum denuò ad cuticulæ apparentiam exhalet & procede ut ante.

Mercurius sublimatus Corrosivus.

Hunc aliunde petere licet.

Mercurius dulcis.

℞. *Mercurij sublimati Unc. VI.*
Mercurij vivi Unc. IV.

Misce exactè in mortario marmoreo usque dum Mercurius vivus planè dispareat. Pulvis hic indatur matracio colli oblongi in arenâ positi & successivis ignis gradibus

Mer-

Mercurius elevetur in altum. Materia autem exempta denuò ſublimetur idque toties repetatur donec Mercurius ſit planè inſipidus rejiciendo ſemper pulverem rubrum in fundo matracii hærentem.

Mercurius præcipitatus albus.

℞. *Mercurij crudi Unc. I.*
Aquæ fortis Unc. I. ß.

Stent in loco calido donec Mercurius ſolutus ſit atque in totum diſpereat. Solutionem hanc ſtillatim cum muriâ forti confundito. Sic præcipitabitur pulvis albus Aquâ calidâ crebro abluendus donec omnem acrimoniam depoſuerit & blando calore inter chartas complicatas exſiccetur.

Mercurius præcipitatus ruber.

℞. *Mercurij crudi Unc. I.*
Aquæ fortis Unc. I. ß.

Detineantur ſuper arenam in phialâ vitreâ donec Mercurius ſit ſolutus dein valido igne f. evaporatio ad ſiccitatem.

Mercurius præcipitatus Viridis.

℞. *Mercurij Unc. IV.*
Veneris Unc. ß.

Solve ſeparatim *in aquâ forti vel Spiritu nitri* & miſc. poſtea abſtrahe *aquam fortem* digere præcipitatum cum *Aceto ſtillatitio* filtra & ſicca ſ. a.

Tur-

Turpethum Minerale.

℞. *Mercurij crudi Unc. IV.*
Olei Vitrioli Unc. XVI.

Miſceantur retortæ vitreæ imponantur & ſimul macerentur per viginti quatuor horas ſuper cineres calidos quibus elapſis inclinato roſtro adaptetur recipiens aucto paulatim igne, deinde augeatur donec omnis humiditas abierit. Maſſa alba à fœcibus ſeparata projiciatur in aquam puram & ſtatim flaveſcet: abluatur ab acrimonia ſiccetur & uſui ſervetur.

Antimonium Diaphoreticum.

℞. *Antimonij crudi lib. ß.*
Sal. Nitri lib. I. ß.

Mixta exacte & in pulverem ſubtiliſ. redacta per vices & cochleatim in crucibulum candens injiciantur & fiet detonatio: poſt detineatur materia in igne per horam dimidiam ita tamen ne fluat. Dein eam cum crucibulo injice in aquam calidam pluvialem quæ illicò lacteſcet, liquorem hunc albicantem effunde & recentem aquam fœcibus reaffunde idque tam diu repetatur donec liquor ampliùs non lacteſcat: liquores iſtos omnes à pulvere ſubſidente effunde. Pulvis autem inſipidus reſtans lente exſiccetur.

Notent Pharmacopœi quod hic Pulvis ſemper recens eſſe debeat, & aëri ſæpè expoſitus iterum qualitatem Vomitivam acquirere.

Crocus Metallorum.

℞. *Antimonij optimi,*
Salis Nitri puriſſimi an. lib. I.

Reducantur ſeorſim in pulverem, mox commiſceantur: tum injiciatur hujus mixturæ uncia una in Crucibulum candens igne carbonum, cum cochleari vel alio inſtrumento commodo, & tegatur illicò tegulâ, ut ſic fiat detonatio, fumum evitando: & cùm univerſa materia jam deflagraverit, ac ſtridor ceſſaverit, injice aliam unciam mixturæ, iterumque hunc laborem repete ignem augendo, donec tota deflagraverit; tum removeatur ab igne, ut quam primùm refrigeſcat: tandem fracto vaſe, materia metallina fuſco rubore prædita (quæ propterea *Hepar Antimonij* appellatur) ſeparetur à cruſta albicante.

Regulus Antimonii Martialis.

℞. *Fruſtor. Chalyb. purioris Unc. IV.*

Candefiant optimè in Crucibulo hinc ſuper injiciantur

Antimonij crudi craſſe comminuti Unc. VIII.

Quæ ſimul liquefiant his liquatis adde

Nitri Unc. II.

Sicque fluant igni impoſita per horam. Deinde effunde materiam in conum fuſorium conuſque parumper concutiatur ut ſic regulus deſcendat qui jam refrigeratus à ſcoriis eſt ſeparandus hic regulus iterum

iterum fundatur tantillum ſenſim injiciendo Nitri: quo perfecta magis fiat ſcoriarum ſeparatio. Tandemque rursùs in conum effuſus regulus ita remaneat uſque ad perfectam refrigerationem.

Anti-hecticum Poterii.

℞. *Reguli Antimonij Martialis,*
Stanni Anglici an. q. v.
Colliquentur ſimul & cum triplo
Salis Nitri.
Detonentur & poſtea aquâ edulcorentur ſ. a.

Butyrum Antimonii.

℞. *Antimonij crudi,*
Mercurij ſublimati corroſivi an. q. v.
Miſceantur exacte in mortario lapideo & fiat deſtillatio per retortam Vitream latioris colli in arenâ adauctis ſucceſſive ignis gradibus, ſic liquor ſive Butyrum Antimonii inſtar glaciei egreditur qui ſi concreſcat in collo vel principio recipientis ne id obſtruat, admove caute carbonem vivum ut liqueſcat, liquorem egreſſum rectifica per retortam vitream.

Bezoardicum Minerale.

℞. *Butyri Antimonij, q. v.*
Alteram partem *Olei Glacialis Antimonij,* priùs ponderatam, & injice in Matracium

ſatis amplum, cui affunde guttatim æquale pondus *optimi Spiritûs Nitri.* Interim cave à noxiis vaporibus. His additis, & diſſolutione peractâ, effunde in Alembicum parvum, & igne arenæ deſtilla uſque ad ſiccitatem. Affunde iterùm relicto pulveri in Alembico jam ſiccato, eandem *Spiritûs Nitri* quantitatem, tunc *Spiritus Nitri* nihil efficiet; exhalare tamen eum fac deſtillando, uſque ad materiæ ſiccitatem. Affunde tertiò eandem *Spiritûs Nitri* quantitatem, & ut ante deſtillando evaporare finito. In fundo Cucurbitæ reperies materiam albam, ſiccam & friabilem, quam in pulverem redactam, diligenter ad uſum ſerva.

Vitrum Antimonii.

℞. *Antimonij in ſubtiliſſ. pulver. redacti q. v.*

Calcinetur in patinâ terreâ vitreatâ primò leni igne per horas aliquot dum fumi ceſſare incipiant ſpatulâ ligneâ continuò agitando ne in glebas concreſcat: dein auge ignem ad incandeſcentiam vaſis donec in pulverem abeat Griſeum hunc funde in Crucibulo donec inſtar Ceræ fluat poſtea effunde ſupra laminam cupream antea leviter calefactam: lente frigeſcant omnia ne vitrum diſſiliat.

Vinum Emeticum.

℞. *Croci Metallorum Unc. I.*

Vini

Vini albi lib. I.

Misce & stent per horas duodecim in infusione calidâ. Deinde usui serventur.

Tartarus Emeticus.

℞. *Crystallorum Tartari Unc. I.*
Croci Metallorum Unc. ß.

Pulverisita coquantur cum aquæ pluvialis f q. ad pelliculæ apparentiam; hinc colata per chartam bibulam duplicatam & Vitro inclusa loco frigidiori ad Crystallisandum repone.

Tinctura Antimonii.

℞. *Mineræ Antimonij lib. I.*
Sal Tartari lib. II.

Detineantur in igne vehementissimo per sex vel octo horas, dein refrigeratis omnibus massa pulverisetur huic pulveri superinde Spiritum vini Tartarisatum ad supereminentiam aliquot digitorum digerantur simul per tres vel quatuor dies donec sanguinis instar rubicunda evadat Tinctura materiam sæpiùs agitando, dein ad usum à fœcibus separata reponatur. Spirit. Vin. Tartaris. sic conficies.

Spiritus Vini Tartarisatus.

℞. *Tartari crudi Unc. VIII.*
Salis Tartari Unc. IV.
Spiritus Vini lib. VIII.

Dige-

Digerantur per diem unum dein destil-
entur ad mediæ partis abstractionem de-
tillat. Spirit. superfunde

Salis Tartari Unc. II.
Tartari crudi Unc. IV.

Destill. denuò ad mediæ partis abstra-
ctionem usui servandum.

Vitriolum album Vomitivum.

℞. Vitrioli albi q. v.

Solve in aquâ pluviâ filtra & evapora
onec crusta apparere incipiat. Pone in
oco frigido Crystallos concretos exime.
Aquam restantem iterum evapora & ter-
ò dum omne sal purum exceperis. Quod
ltimò cum Aqua Rosarum solutum Fil-
ratum & coagulatum calore levi siccetur
d usum.

Oleum Vitrioli.

℞. Vitrioli optimi ad cineritium flavescentem Pulverem exsiccati q. v.

Destilletur f. a. ex retortâ lutatâ serva-
s ignis gradibus. Oleum destillatum po-
ea rectificetur servato seorsim capite
ortuo seu *Colcothar*.

Flores Sulphuris.

℞. Sulphuris purissimi q. v.

Sublimetur ex Cucurbitâ terreâ vitratâ

ſuperimpoſito Alembico vitreo vel terreo vitrato per mediocrem arenæ calorem, floreſque colligantur uſui ſervandi.

Oleum Sulphuris.

℞. *Sulphuris q. v.*

Imponatur crucibulo & accenſum deſtilletur ſuperimpoſitæ campanæ vitrea ut artis eſt.

Balſamum Sulphuris Vulgare.

℞. *Florum Sulphuris Unc. II.*
Sal Tartari Unc. I.

Miſceantur & liquefiant exacte, donec atro purpureum induant colorem, hiſce poſtea Pulveriſatis adde

Olei Terebinthinæ Unc. IV.

Coq. ſimul in Phiolâ vitreâ in arenâ repoſita per tres horas: dein omnibus frigefactis clarum à fæcibus ſepara & ad uſum ſerva.

Balſamum Sulphuris Aniſatum.

℞. *Maſſæ Sulphuris ſupra ſcriptæ Unc. II.*
Olei Aniſi Unc. III.

Coq. in B. M. per octo horas materiam ſæpiùs agitando poſtea frigefacto vaſe, Oleum ſupernatans tinctum uſui reponatur.

Flore

Flores Benzoin.

℞. *Benzoin optimi pulverif. q. f.*

Ex ollâ terreâ ad formam cucurbitæ facta, cui fuper impofitus eft conus Chartaceus, igne leni f. fublimatio: fic poft horam dimidiam flores afcendere incipient, qui fingula hora femis cum plumaceola colligendi funt.

De Salibus fixis & Volatilibus.

Sal Abfinthij,
Cardui Benedicti,
Scordij,
Stipitum Fabarum &c.

Herbæ ficcatæ exurantur in cineres ex quibus per aquam calentem fiat lixivium quod filtrandum & lento carbonum igne evaporandum in fal, quod ut purius reddatur iterum folvendum filtrandum & coagulandum.

Cryftalli Tartari.

℞. *Tartari Rhenani pulverif. q. v.*

Ebulliat cum multâ aquâ quæ fic impregnata dum adhuc calet, per chartam bibulam coletur in vas idoneum, deinde frigori per noctem aut diutiùs exponatur, Cryftalli lateribus vafis accrefcent quos effusâ aquâ colligito & ficcato.

Tartarus Vitriolatus.

℞. *Liquoris Tartari q. v.*

Inſtilletur ei ſucceſſive Oleum Vitrioli rectificatum donec nulla amplius f. efferveſcentia dein f. evaporatio ad ſiccitatem.

Sal fixum Tartari.

℞. *Tartari albi crudi q. v.* vel
Maſſam nigram poſt deſtillationem Tartari in retortâ reſiduam.

Tartarus crudus in furno figulino; maſſa verò nigra nude inter prunas calcinetur donec albaeváſcerit, ex hac per aquam calide affuſam paretur lixivium quod filtretur in vas vitreum vel terreum, effundatur & exhalet donec omnis humiditas ſit abſumpta ſic in fundo remanebit ſal album.

Quod ſi per dies aliquot vaſe vitreo pleno exceptum in cellâ aëri exponatur ſolvetur in liquorem *Oleum Tartari per deliquium* impropriè vocatum.

Sal Prunellæ.

℞. *Nitri puriſſimi pulveriſ. lib. I.*

Liquefiat in crucibulo liquefacto per vices inſperge

Sulphur. comm. Unc. I.

Quo deflagrato, effunde nitrum fuſum in

n pelvim cupream mundam fiantque lamellæ.

Sal Nitri fixum ejusque Liquor.

℞. *Nitri purissimi Unc. III.*

In pulverem subtilem redactum indatur crucibulo mundo imponendo carbonibus accensis ut fiat instar aquæ: cum fluxerit injice frustum carbonis igniti & fiet nflammatio, donec injectum illud frustum effervescendo cum nitro sit consumptum, tum repete illam carbonum injectionem donec nitrum non amplius inflammetur sed maneat sub massa siccâ virescente tum

℞. *Nitrum hoc modo fixatum.*

Solvatur in aq. ferventis q. s. solutum filtra per chartam. Filtrati f. evaporatio n vitro idoneo ad siccitatem usque & remanebit in fundo sal acerrimum.

Hoc sal in orbe vitreo in cellâ aëri exponatur, tam diu illic relinquendum donec per deliquium fuerit solutum in liquorem limpidum *alcahest glauberi* dictum.

Salis Essentialis conficiendi modus.

℞. *Plantæ cujusvis recentis & succulentæ q. v.*

Contund. in mortario lapideo deinde affusâ copiosâ aquâ font. clarâ coq. ad medict. consumpt. decoctum coletur for-

titer exprimendo. Colat. iterum coquatur ad Mellis consistent. reponatur in vase fictili vitreato loco frigido per octiduum, & Sal Crystallinus concrescet qui affuso decocto colligitur, propriâ aquâ abluitur & siccatur ad usum.

Spiritus Cornu Cervi.

℞. *Frustulorum Cornu Cervi q. v.*

Indantur retortæ ad medietatem implendæ post amplo recipiente adaptato fiat destillatio igne aperto gradatim: sic ascendent Phlegma, Spiritus, Sal Volatile & Oleum fætidum: Sal Volatile cum liquore reliquo ab Oleo fætido per filtrationem separato. Mixtum in Cucurbitâ altiore super arenam destillando rectificetur: Sal Volatile Spiritui admisceatur vel singula separatim asserventur pro lubitu.

Sal Volatile Cornu Cervi.

℞. *Spiritum Cornu Cervi ab Oleo separatum. Sal Cornu Cervi primâ destillatione collectum.*

Excipiantur phialâ superposito alembico & recipiente vasi huic adaptato: lenissimo sed gradatim aucto igne ascendet Sal Volatile Alembici rostro & lateribus adhærens quod separatim excipiendum.

Sal

Sal Volatile & Oleum Succini.

℞. *Succini contuſ. q. v.*

Indatur retortæ ut tertia ejus pars repleatur, deſtilletur gradatim ignem augendo ita ſimul aſcendent Oleum & Sal Volatile, hoc Sal aquâ calidâ eluatur & ſeorſim ſuper proprium reſiduum calcinatum rectificetur ut album evadat. Oleum autem per ſe ſ. a. rectificetur.

Spiritus Salis Armoniaci.

℞. *Salis Armoniaci lib. I. ß.*
Tartari lib. ß.

Seorſim pulveriſ. & commixta indantur Cucurbitæ Vitreæ benè munitæ affundendo aquæ communis *Unc. XXXII.* deſtillentur leni calore in arena *Unc. XVI.* Spiritus reliquus minùs potens ſeorſim aſſervetur.

Flores Salis Armoniaci.

℞. *Salis Armoniaci,*
Marini decrepitati an. q. v.

Pulveriſata & mixta indantur Cucurbitæ figulinæ cui in arenâ poſitæ cæco capitello adaptato ſub initio ignem lenem adhibeto eumque ſenſim adaugeto quo uſque Sal Armoniacum ſub farinæ formâ aſcendat dein ignem continuato & cum nihil

ampliùs ascendere animadvertitur, vasa refrigescere permittito, capitellum removeto & flores pennâ colligito.

Spìritus Nitri.

℞. *Nitri purissimi lib. I.*
Boli communis lib. III.

Exacte mixtis f. s. a. destillatio per retortam.

Spiritus Salis.

℞. *Salis Marini albi lib. II.*
Laterum pulveris. lib. VI.

Exacte mixta indantur retortæ terreæ ad medietatem adaptato amplo recipiente primò parcâ manu ignis adhibeatur qui phlegmate egresso augeatur donec omnes Spiritus nebularum instar egressi sint, Spiritus à phlegmate rectificatione separetur.

Spiritus Salis Dulcis.

℞. *Spiritus Salis optime dephlegmati Unc. III.*
Vini rectificati Unc. IX.

Destillentur s. a. per Alembicum Vitreum.

Lapis Infernalis.

℞. *Argenti Copellæ tenuiter laminati Unc. I.*
Aquæ fortis Unc, II. ß.

Dissol-

Diſſolvantur igne lento in vaſe vitreo ſtrenuo, poſtea coquantur vaſe aperto igne arenæ ſub camino cavendo à fumo ad humiditatis ſuperfluæ conſumptionem poſtea effunde in conum fuſorium, priùs calefactum & refrigeratus Lapis ſervetur ad uſum.

Ruptorium Commune.

Fit ex lixivio fortiſſimo ſecundùm artem exſiccato.

Lapis Medicamentoſus Crollii.

℞. *Vitrioli viridis lib. I.*
albi lib. ß.
Aluminis crudi lib. I. ß.
Anatron, id eſt, *Fel vitri*,
Salis communis an. Unc. III.
Salis Tartari,
Abſinthij,
Artemiſiæ,
Cichorij,
Perſicariæ,
Plantaginis an. Unc. ß.

Ponantur in olla vitreata, & affunde parùm *Aceti Roſati*, ac coque igne lento ſæpiùs agitando: ubi incipiet craſſeſcere, adde

Ceruſſæ Venetæ,
Boli Armeni an. Unc. IV.

Miſceantur omnia diligenter, donec

vi ignis mediocris in lapidis duritiem *Maſſa* concreverit, quæ poſtea fractâ ollâ eximenda, & ad uſum probè aſſervanda.

Si *Gummata Myrrham*, videlicet & *Thus*, volueris addere, inſtituatur coctio lenta, ne comburantur, & vis illorum in igne evaneſcat.

Aqua Fortis.

℞. *Vitrioli ſiccati lib. II.*
Salis Nitri lib. I.

Trita ſimul miſceantur, & deſtilla per retortam Loricatam, igne aperto per gradus.



CLAS-



CLASSIS DECIMA-SEXTA.

De Cognitione & delectu Medicamentorum simplicium.

IN gratiam Tyronum additus est Tractatulus iste, de cognitione & delectu Medicamentorum simplicium; non omnium quidem, sed præcipuorum & magis necessariorum, ex variis Authoribus collectorum, & ordine alphabetico dispositorum prout sequitur.

ACacia *Arbor* est, ex cujus semine maturo, ejusdem nominis succus exprimitur nigricans: ex immaturo rubescens seu subfulvus. Et hîc vera veterum *Acacia*, quæ *Theriacam* ingreditur, recipiendaque est, ubi *Acaciæ* simpliciter mentio fit. Ex omnibus præstantissima perhibetur *Luteo rubra* odoris grati.

Æris Flos, æris scobe tenuissime delimatâ polluitur. Optimus est friabilis, in attritu fulvescens, milii effigie, ponderosus, gustu adstringens & modicè splendens.

Æris Scoria, est recrementum illud spongiarum modo spumosum, quod Fabri tam de ferro quàm ære abjiciunt.

Æris

Æris squamma, est fragmentum, sive ramentum quod malleis æri excutitur, quâ de causâ æris rudis squamma cæteris præfertur, ex qua clavi fiunt. Probatur crassa, rufa præsertim æruginosa.

Ærugo, est æris veluti rubigo in æreis vasis, laminis, squammis, scobibus, lapidibus concreta, decem diebus *Aceti acerrimi* vapóre post decussa vel derasa.

Æs ustum probatur rubrum, contusu Cinnabarinum colorem imitans; nigrum verò plus quàm decet exustum est.

Agaricus fungus est arboribus adnascens Laryci: estque duplex, & ratione sexus mas & fæmina, & ratione coloris candidus & niger. Probatur *Agaricus* qui candissimus est & levis, item friabilis, minimè lignosus, rarus, primò statim gustu dulcis, mox amarus, astringens, ac etiam subacer, qualis estqui fæmina nominatur; qui verò nigricans, densus, ponderosus, filis quibusdam veluti nervis interfectus, acerbusque maximè improbatur: quin & qui corrosus, & qui propè caudicem est.

Aloës, alia est *lucida* seu *succotrina*, alia *hepatica*. Præstantissima est *succotrina*, seu *lucida*, quæ est pinguis, glutinosa, transparens ex rubro rufa, *Hepatis* modo coacta, boni odoris *Myrrham* æmulantis, syncera, friabilis digitis, arenarum & calculorum expers, facilè liquescens, & eximiæ amaritudinis. Hepatica non tam boni odoris est ut *succotrina*, nigrior fractuque contumacior est.

Aloës

Aloës Lignum eligitur Indicum, colore nigro, cinereis venis discurrentibus, ponderosum, ita ut suâ gravitate in aquam conjectum non innatet, sed subsideat, durum crassum, quodque accensum flammam diu retineat, humidâ pinguedine prægnans. Quò majora sunt fragmenta, eò plus facultatis in se continent.

Ambra optima censetur *Grysea odoratissima*, quæ à sordibus maximè repurgata est, quæque plurimùm ad candorem accedit, quæ videlicet cinerei sit coloris, aut quæ ex venis nunc cinereis nunc candicantibus constat, levis, pinguis, & si ejus fragmentum candenti ferro applicatum, veluti in oleum resolvatur. Pessima est nigra, & vilis, quâ odor chyrothecis conciliatur.

Ammoniacum probatur benè coloratum, *Tigni*, *Calculorum*, ac aliarum sordium expers, *Thuris* similitudine, minutis glebis, densum, syncerum, odore *Castoreum* utcumque referens, & gustu amarum. *Ferulæ* succus est, quæ in *Africa* gignitur juxta Ammonis Oraculum.

Amylum, *Amidum*. De multis cerealibus fieri potest, sed optimum, quod ex *Tritico* quinquies aquâ madefacto fit, quod ubi emolliri cœperit, inquit *Dioscorides*, sensim aqua affundenda sine additione, ne quod utilè est unà effluat. Ubi mollissimum fuerit, effusâ aquâ pedibus calcari ac constringi debet; deinde aliâ aquâ superfusâ denuò calcari: tum enatantes ibi

Fur-

Furfures Cribro excipiendi; reliquumque quallo ſportiſque ſiccatum è veſtigio novis tegulis torreatur in Sole, & ſervetur.

Anacardus fructus eſt cujuſdam Arboris, cui Græci nomen indiderunt, à cordis tum ſimilitudine, tum colore. In èo liquor reſidet mellis craſſitie, inſtar ſanguinis rubicundus, guſtu adurente; in medio nucleus eſt exiguæ Amygdalæ effigie; præferuntur *Anacardia* pleniora, & habiliora, fuſca, reſina in cortice multa acri nigra, nucleo intùs albo. Magna ejus eſt copia in *Malabar* & reliquis *Indiæ* Provinciis.

Anime, aliud ex *Orientali India*, aliud ex *nova Hiſpania Indiæ Occidentalis* adfertur. 1. *Anime Orientale* eſt *Gummi*, quod ex *Orientali India Luſitanorum* navibus in *Europam* adfertur, eſtque trium generum, primum fulveſcit & pellucidum eſt, planèque nobilius, ſuccinum crudum emulatur. Alterum genus nigricat, & ferè ſimile eſt *Taurino* glutini, ſive illi reſinæ, quam officinæ *Colophoniam* vocant. Tertium genus pallidum eſt, & reſinaceum retorridumque. Omnia verò jucundum in ſuffumigiis ſpirant odorem, idemque videntur temperamentum ſortita: poſteriora tamen duo deguſtata, magis ſiccare & amareſcere deprehenduntur. 2. *Anime novæ Hiſpaniæ* eſt Arboris mediocris magnitudinis *Copalliferæ* vocatæ, *Lacryma*, ſeu *Reſina* per inciſionem *Thuris* aut *Maſtichis* modo collecta, alba ad *Thuris* colorem nonnihil vergens. Defertur granis *Thuris*,

ſed craſſioribus, quæ confracta luteum colorem oſtendunt inſtar reſinæ: gratiſſimi ac ſuaviſſimi eſt odoris, & prunis impoſita facilè conſumitur. Differt ab *Anime Orientali*, quod neque tam candidum neque tam lucidum ſit.

Aſpalathus, frutex eſt ſucculoſus, variis horreſcens ſpinis, naſcitur in *Iſtro*, *Niſyro Syria* & *Rhodiorum Inſula*. Optimus eſt gravis & ponderoſus, detracto cortice rubeſcens, aut in purpuram vergens, denſus odoratus, guſtatu amarus. Eſt & aliud genus candidum, lignoſum, ſine odore, quod deteriùs habetur. Pro *Aſpalatho*, ſi deſit, ſuccedaneum erit ſemen *Agni caſti*, aut *Lignum Aloës*, aut *Santalum Citrinum*.

Aſa dulcis, *Aſſa dulcis*, officinarum, eſt *Benzoinum* ſeu *Cyrenacei Laſerpitij Lacryma*. Probatur *Benzoinum*, ſyncerum & tranſlucens colore rubeſcens, *Electre* ſimile, guſtu gratum, durum, albis diſtinctum unguibus, aut glebulis, odore admodùm blando, *Xyloës*, odorem referente præditum, fuſcum autem & impurum improbatur.

Aſa fœtida, *Aſſa fœtida*, ex *Media* & *Syria* defertur, fœtidi viroſique odoris *Sagapenum* redolentis. Melior eſt quæ vergit ad rubedinem, ſplendens, *Myrrham* non porrum referens, & quæ facilè diſſolvitur in album colorem. Adulteratur antequàm ſiccetur cum *Serapino* & *Farinæ Fabarum*, ſed dignoſcitur facilè adultera-

ta,

ta, ſapore, odore & calore.

Auripigmentum, metallica res eſt aurum colore imitans. Ejus apud *Dioſcoridem* duo ſunt genera; unum è multis *Squammis*, ut altera alteri impoſita videatur, conſtat: id ſi purum fuerit, nec ulli materiæ permiſtum optimum exiſtimatur. Alterum colore *Sandarachæ*, hoc eſt rubrum glandis effigie. Deligendum ergò aureo colore micans, è tenuibus *Squammis* compactum, quod facilè funditur, & lapillis aut terræ permixtum non eſt.

Balſamifera Arbor, ſeu *Arbor Balſami Indici*. Arborem hanc *Pannucini Chucte* vocant, noſtri *Indici Balſami* arborem, *Mexicenſes Boitziloxiel*, ſeu affluentem reſinam nuncupare conſueverunt, quia liquorem effundit *Syriaco Balſamo* ſimillimum, neque odore aut viribus inferiorem. Arbor eſt *Mali Medicæ* magnitudine, foliis *Amygdali* majoribus, tamen rotundioribus, & magis acuminatis. Floribus in extremis ramorum flagellis luteis, initio loculorum oblongorum forma, ſed procedente tempore quorumdam veluti foliorum, cæteris longiorum & latiorum, in quorum extremitatis cavitate, ſemina, incluſa continentur, candicantia, & in quemdam pallorem inclinantia. oblonga, & pauliſper contorta, ſeminibus *Mali Medicæ* ſimilia. Inciſo ergò quovis anni tempore hujus arboris cortice ſtipiteve, ſed præcipue exactis jam atque deſinentibus imbribus, *Liquor* ille nobilis toto orbe celeber

leber, necdum satis laudatus stillat, quem *Balsamum* appellant è fulvo in nigrum inclinans colorem, sapore acri, paulisper amaro, odore vehementi, sed tamen gratissimo.

Bdellium, densata lacryma est ex arbore *Saracenica* quadam *Ceraso* simili cortice vestita emanans, atque circa ramulos in magnos grumos concrescens, qui tam integri quàm confracti ex *Arabia*, *India*, & vicinis aliquot locis adferuntur, unà cum adhærente sæpè cortice & ramulis. Hoc *Myrrhæ* concretione & adspectu simile: quare censuit quidam *Bdellium Myrrhæ* speciem esse (quidam *Anime* esse voluit) à qua differt non solùm quod arbores sint differentes, sed & in eo quod *Myrrha* sit fragilior, & in igne, ut resina, ardeat: at *Bdellium* magis naturam *Gummatis* resipit, difficile enim ardet, & humore mollescit, odor non sine gravitate suavis. Probatur gustu amarum, translucidum, intùs pingue, liquescens facilè, & si digitis subigitur, mollescens, ligni ac sordis expers, suffitu odoratum, & albis maculis, ungui humano simillimis refertum, improbatur nigrum sordidum uberioribus glebulis in offas convolutum: adulteratur *Gummi* & *Cerâ*; sed fraus gustu & odore innotescit, quia non ita amarum nec odorum est.

Bezoar Lapis Orientalis, ex quo Animali proveniat diversi Authores diversa scripsere, & præcipua pars tenet quod sit Animal *Persiæ* ac *Indiæ Orientalis* partim

Cervo ſimile, partim *Capræ* hinc fit ut alii *Capra* audiat, aliis *Hircus*, aliis *Capri Cerva*: v.g. dicitur *Capra Indica*, *Amato Capra montana Menardo*, *Capra ſilveſtri Lacunæ*; *Pazon Perſis*.

Bezoar Lapis Orientalis, qui eſt *Lapi* in dicto Animali repertus (ac potiſſimum in proventriculo, hinc & in ventriculo aliiſque cavitatibus internis) figurâ ſcilice variante, ovali, rotundâ, ſeſſili & intù cava (meditullio paleam pilos vel ſimile continente) ſuperficie levi & ſplendente ſubſtantiâ è laminis inſtar Cæparum ſeſe incumbentibus compactâ: variante item colore (plerumque atrovirente, hinc dilutiùs virente palleſcente, cineritio, fulveſcente, melleo, &c.) odore nullo; variante magnitudine & pondere (pleriſque ſcilicet infra *Juglandis* magnitudinem conſtitutis, nonnumquam & paulò majoribus.

Nota. Dantur & adulterati, ſeu falſ confecti, ſcilicet ex *Lapidum* fragmentis & pice artificiosè coaugmentatis. Item ex creta, cineribus *Teſtarum*, *Sanguine ſicco*, & *Lapidibus Bezoar* minoribus pulveriſatis, & cum *Liquore* incorporatis: item ex *Cinabari*, *Antimonio*, *Mercurio* ignis artificio compactis, tinctis, &c. qui ſanè non modò citra utilitatem, ſed & cum detrimento in uſum accerſuntur.

Notæ ergò bonitatis ab Authoribus paſſim notatæ ſunt.

1. Forma à forma renum aut ovi columm-

umbini exteriùs levigati diverſa, utpote
ļuæ ſignum Lapidis adulterati.

2. Structura Laminis multis inſtar Cæ-
ɔarum ſeſe invicem incumbentibus, iiſque
ingulis glabris, levibus, ſplendore coruſ-
:antibus, quod tamen alii reprobant.

3. Cavitas (Meditullium) expers rei
ıeterogeneæ præter pulverem, quidam
nalunt incluſam Paleam, Feſtucam, Gra-
ıum & ſimilia.

4. Pondus aliis leviùs, nonnullis gra-
/iùs.

5. Commiſtio cum Calce, verbi gratiâ,
i Lapis humectatus & Calci vel muro af-
ric tus, Calcem colore viridi tingat: ſi
Lapis Calce vivâ (cui admiſtâ aquâ) inun-
ctus paulò poſt flaveſcat: ſi Lapis chartæ
:reta oblitæ affrictus viridem inducat li-
ıeam: ſi pulvis cum Calce vivâ mixtus
:olorem ex pallido virentem referat
(quod tamen non de omnibus verum eſſe
ɔoteſt.

6. Friabilitas & diſſolutio in aqua, quæ
amen itidem & falſi Lapidis propria eſſe
ıon nequit.

7. Liquatio, verbi gratiâ, ſi acus can-
łens intrudi poſſit.

8. Diſparitas fragmentorum cum gypſo
ıut terra cocta (in duritie ſcilicet.)

9. Experimentum.

Verùm enim verò, ſumma in dijudica-
ione Lapidis cautio adhibenda eſt, neque
ıbſque notarum ſyndrome de bonitate ali-
ļuid certi ſtatuere expedit, præſtantiſſimus

inter cæteros habetur *Perficus*.

Bezoar Lapis, provenit ex Animali *Peruano*, *Capri-Cervo Orientali* fimili, cornibus tamen orbo, depafcente herbas falutiferas. *Lapis Bezoar Occidentalis*, qui eft *Lapis* locis iifdem Animalis, ut de priori dictum, circa rem heterogeniam in cavitate media contentam tunicatim concretus, *Orientalibus* ut plurimùm major superficie fcabra, colore cinericeo albo, nigro, obfcurevè virente, qui optimus. Præftantiores habentur (uti & *Orientales*) ex Animalibus montanis exempti.

Bitumen Judaicum cæteris anteponitur. Eligitur fufco colore, fplendidum, ponderofum ac validum odorem vibrans, dum aquis innatat molle; cùm ficcatum eft, Pice ficcâ duriùs efficitur. Nigrum autem, & fordidum vitiofum eft. Adulteratur Pice, quod color niger indicat & Picis odor.

Campora, *Capur*, & *Cafur Arabibus* dicta in Burneo optima eft, eft autem arbor (quam Garcias & Clufius fe vidiffe fcribunt) magna inftar *Salicis*, è cujus *Meditallio* hæc Lacryma extrahitur, quæ per fe coagulatur. Lignum hujus arboris eft album & leve. Melior *Camphora* eft candida, perlucens, pura, friabilis, tenuis & valdè odorata: Craffa verò, fufca, nigra, affulis ligni fui implicata improbatur: pani calido impofita fi madefcat, fyncera eft; fi arefcat fpuria. Si interdùm rubentibus, aut nigricantibus maculis confperfa videa-

tur,

ır, id ex fordidarum manuum contre-
:atione, aut ex madore fieri dicunt; fed
ıcilè id emendatur, fi in panno lineo
olligatur, in calidam aquam dimittatur,
ldito *Sapone* & *Limonum* fucco; deinde
:obè elota in umbra ficcetur: fic candida
:dditur. Affervatur femine *Lini*, aut *Mi-*
, aut *Pfylij*, aut *Pipere* fepulta, ne aëri
ɪpofita evanefcat.

Carneolus Lapis, *Sardius*, vel *Sardinus*
linio dicitur, fimilitudine à *Sardis Sale*
onditis defumptâ, quod eorum colorem
præfentet, vel quod loturæ carnis fimilis
:: quâ ratione Gemmarii illum *Carneo-*
m, vel *Corneolum* appellant. Laudatiffi-
ıus circa *Sardiniam* reperitur, & qui pu-
ſſimâ juxta, & nitidiffimâ confiftit fub-
ıntiâ, colore carneo & tranflucido.

Caffia folutiva. Arbor (unde colligitur)
t procera inftar *Juglandis*, folia habens
valdè fimilia. Ligni materies valdè com-
ıcta. Fructus *Siliquæ* funt longæ, rotun-
e, nigræ, intùs medullâ multâ, nigrâ
multis feminibus rotundis, & planis,
ıæ à fe invicem membranis ligneis ac
ınfverfis dividuntur prægnantes. Eligen-
ı eft quæ ex *Memphi* & *Alexandria Ægyp-*
convehitur, non admodùm craffa, pel-
cens, recens, gravis, fracta, & quæ
ncuffa feminibus minimè conftrepit.
tendi tantum tempore extrahenda: nam
tra Cannas promptè corrumpitur, & in
fis fervata pejor evadit. Advehi cepit &
Brafilia Craffia purgatrix, cujus uncia

una plus purgat, quàm unciæ duæ *Cassi*
illius *Ægyptiacæ*.

Cassia Græcorum, ut ex Dioscoride &
Galeno colligere licet, *Cinnamomum* siv
Canella officinarum videtur, quam pr
Cassia aromatica uti possimus. Præfertu
rufescens, longa, gustu cum acrimoni
grato, odore optimo & suavissimo.

Castoreum Medici vocant *Fibri* seu *Ca*
storis testes. Est autem *Fiber*, seu *Cast*
Animal amphibium, ex albo cinereum i
dorso nigricans; quod partim in aqua
partim in terra victitat, & ex utroque pa
bulum venatur, *Lutrarum* modo, quibu
valdè simile est caudâ exceptâ, quæ *Ca*
stori glabra est, & lata, & Piscium mod
squammosa, *Lutris* longa, rotunda, hi
pida rufa, & ad castaneam accedens,
& totum corpus. *Castoris Testes* eligi d
bent, qui ex uno ortu connexi sunt,
quore intùs veluti cereo, odore gravi,
virus redolente, gustu acri, ac mordent
friabiles, naturalibus tunicis circumdat
Diligenter animadvertendum est ne ab im
postoribus factitii *Castoris Testes* emantur
pauci namque habentur, qui adulteri
careant, cujus manifestum est indiciun
nimia eorum magnitudo, cùm legitim
parvi admodùm sint.

Chalcitis metallica res est, in venis Æ
rariis nata, præfertur Æri similis, friabi
lis, nec lapidosa, nec inveterata incursan
tibus oblongis venis splendentibusque
promptissime liquescens: usta melior e
quàn

quàm non usta, & quæ urendo cineritia evaserit, modus urendi in *Dioscoride* est l. 5. cap. 75.

China, *Chinæa radix*, *China radix*, alia est *Orientalis*. Ex Regione *Sinarum China* dicta. *Occidentalis* ex *Hispania nova* & *Peru*. Præfertur *Orientalis*, quæ exteriùs est colore rubente aut subnigro, interiùs candicante aut subrubente: & hæc quò nigrior, eò melior. *Occidentalis* colore est interiùs magis rufo. Optima est recens pondere præstans, solida succulenta, non cariosa aut sapore insipida.

Corallium, ab effigie, & natali loco sæpè nec impropriè *Lithodendron*, quasi *Lapid-arbor*, & aliquando *Frutex marinus* dicitur: nam ut ait Macer, hoc velut arbusti ramusculus esse videtur in Tyrrheno siquidem, & Siculo mari provenit & *fruticis* instar assurgit, ac ramos emittit. Hinc à nonnullis inter *Frutices*, ab aliis inter *Lapides*, à quibusdam inter *Bitumina* reponitur. Verè tamen nihil istorum est. Sed inter omnia ambigit. Triplici autem agnoscitur discrimine, si quidem rubrum, aliud album, & tertium nigrum, priùs ut aspectu jucundius, sic melius, medicatius, & ad armillas aliaque ornamenta aptiùs. Album ut spongiosius, sic levius magisque refrigerans. Nigrum rariùs visitur, minusque medicatum & expetitum. Laudatissimum rubeum, quod semper usurpatur, cum absolutè *Corallium* ponitur. Aliud insuper datur mixtum, intermixtis nempè

coloribus intercurſantibus, eſtque minùs bonum. Rubeum ut cæteris præſtet, debet eſſe colore floridum, ut *Alga* odoratum, ut *Frutex* ramoſum, fractu facillimum, non ſcabroſum, lapideum, nec rursùs inane aut concavum. Idem de albo intelligendum.

Coſtus præcellit ſolidus, optimè plenus, cortice cinereo ſive palleſcente, intùs candicans, interdùm colore buxi, odore admodùm fragrans, irinum videlicet, ſive violaceum ſpirans odorem, à teredinibus non eroſus, guſtu acuto, ac linguam vellicante. Omnes ferè optimi *Coſti* notæ in *Angelicæ radice* reperiuntur. Hinc ut nonnulli putent, eam pro vero *Coſto* ſubſtitui poſſe.

Curcumæ radix laudatur recens, intùs *Crocea*, foris *Zinziberi* perſimilis; vehementi amaritudine & acrimoniâ dum recens eſt caret, ob multam humiditatem; ſiccata verò acris eſt, ſed non adeò ut *Zinziber*.

Cyperus naſcitur in *Italia*, in paluſtribus, & humecto ſolo, quin & jam locis cultis. In *Germania* in hortis quibuſdam colitur, optimus defertur ad nos ex *Syria* & *Alexandria Ægypti*, in cujus defectu *Italicum* ſupponunt officinæ. Reperitur verò in officinis *Cyperus* duplex, radice rotundâ & longâ; 1. *Cyperus* rotundus fortè à radicis effigie quæ pixidulam, aut poculum vaſculumve puſillum imitatur dictus videtur; hic præfertur ad uſum Medicum, qui ſi

deſit

desit longus *Cyperus* substituitur. *Dioscoridi* est optima radix gravissima, densa, fractu contumax, plena & aspera, odoris cum quadam acrimonia jucundi. 2, *Cyperus longus*. Volunt quidam quod hic *Cyperus* longis radicibus discriminis gratiâ vocetur *Cyperis*. Qui verò rotundis est radicibus, *Cyperus*.

Dictamnum legitimum ac probatissimum in *Creta* Insula tantùm gignitur. Alia verò planta *Dictamnum album*, vocata *Fraxinella*, planè à *Dictamno Cretensi* diversa, quæ quamvis valdè efficax sit, *Dictamno Cretensi* substitui tamen non potest.

Elaterium, est succus *Cucumeris Asinini* condensatus; optimum censetur leve, non ponderosum, cum candore leniter humectum, gustu amarissimum, quodque lucernarum luminibus objectum facilè flagret, porraceum autem scabrumque si turbidum spectetur, atque ervi cinerisque plenum sit ac grave, vitiosum statuitur. A Theophrasto statuitur *Elaterium* Medicamentorum omnium diuturnissimum, optimumque quod vetustissimum.

Elemni, resina est *Cedri* aut *Oleæ Æthiopicæ*, eligatur ex *Citrino* pallescens, per quam odora, pura, & à pulverum admixtione immunis. Adulteratur resinâ; sed fraus odore fit manifesta.

Euphorbium succus est acerrimus, ex Arbore *Lybica* ferulæ speciem habente emanans. Eligendum est translucens & acre; adulteratur Sarcocollæ & Glutinis

mistio-

mutione. Sed difficile quidem experimentum, quippè cum levi guſtu os accenſum diù detineat, adeò ut quidquid ori objiciatur, planè *Euphorbium* reſipiat.

Galanga veteribus *Græcis* ignota, & *Arabibus* non ſatis perſpecta, habetur duplex: major & minor; 1. *Galanga* minor *Cyperus Babylonica* ex *Chinarum* Regione in *Indiam*, & inde in *Luſitaniam* defertur, unde *Chinenſis Galanga* dici poteſt. Optima eſt quæ fuerit gravis, ſaturatè rufa, odorata & guſtu acerrima. 2. *Galanga* major, tametſi longè craſſior radix ſit, ignavior tamen eſt, & viribus infirmior, colore etiam dilutior, minuſque odorata, foris ſubruffa, intùs *Zinziberis* palliditate prædita, guſtu acerrima ſine aromatica aliqua gratia; hâc in nulla confectione utendum eſt.

Galbanum eſt ſuccus naſcentis in *Syria Ferulæ*, ſeu *Liquor Grumis* flavis aut candicantibus compactus, ſubſtantiâ molli, pingui digitis adhærente, ſapore amariuſculo, odore gravi. Eligendum purum, pingue cùm accenditur flammam nutriens, mediocriter viſcoſum, colore flavum tale cùm recens eſt *Dioſcoridi* maximè laudatur *Cartilaginoſum* (vel ut alii vertunt granulis refertum) *Thuris* effigiem præbens, pingue minimè lignoſum, retinens nonnihil adjecti ſeminis, & *Ferulæ*, gravi odore, neque valdè humidum, neque nimis aridum.

Granatus eſt gemma pellucida, ex flavedine

vedine rubens, ignis instar, *Miniique nativi*, vel factitii colorem ferè referens. Sunt *Granati* alii *Orientales*, alii *Occidentales*, *Orientales* uti meliores, ita & pretiosiores; proindè Provinciam officinalem solis *Occidentalibus* linquunt.

Hæmatites Lapis, *Lapis sanguinarius* (quod fractus sanguinem imitetur, vel quod sanguinem sistat) foditur non modò in *Ægypto*, sed & in pluribus *Germaniæ* & *Bohemiæ* montibus, præsertim in *Hercynia* sylva, & in ferri fodinis quibusdam. Commendatur friabilis, saturo colore niger, durus, & suopte ingenio æqualis, nullâ sorde admistâ, nulloque Zonarum discursu.

Hermodactylus, radix est officinis nota, probatur candidus, corpulentus, plenus, gravis; non cariosus, qui leni contusione in pulverem Farinæ triticeæ similem facilè redigitur, sapore suavi & dulci.

Hyacynthus est gemma pellucida, ex flavedine rubens, ignisque flammas imitans. Sunt alii *Orientales*, alii *Europæi*. Hi inveniuntur ad *Iseram fluvium* in confinibus *Silesiæ* & *Bohemiæ*, suntque *Orientalibus* ignobiliores. Quoad colorem, referunt alii colorem *Miniÿ nativi*, aut sanguinis admodùm biliosi; & hi sunt præstantissimi: alii rubedine *Croci* flavescunt; alii exactè ostendunt succini colorem, & hi viliores, alii albi pellucidi succini colorem referunt; & hi omnium vilissimi habentur.

Hypocistis copiosè ad *Cisti maris* Radices nasci-

nascitur, quæ summis cespitibus diffunduntur, & cohærent, novo nempè vere cum çistus jam ad explicandos flores se parat; nam quando primùm emergit purpureo apparet colore, deinde paulatim assurgens & sese explicans, multum pristini coloris remittit, & cytinos suos profert candicantes turgidos, & lento succo plenos, qui etiam *Hypocistis* appellatur. Nascitur in pluribus *Etruriæ* asperis locis, montibus potissimum, *Lucensibus*, *Apennino* quoque monte, itemque in *Hispania*, *Lusitania*, & *Gallia Narbonensi*.

Jalappa incognita fuit veteribus. Veram autem historiam *Jalappæ* exponit Gregorius Horstius libro tertio Epistolarum Medicin. est autem nihil aliud docente Closſæo, quàm mirabilis *Peruviana*, cujus radix inodora in diebus Canicularibus effoditur, tesseratim inciditur, inque loco umbroso siccatur.

Kinkinna, *Kinakina*. Arbor ex nova, quæ *Orientem* spectat, *Peruvia*, vocatur ab incolis *Gannanaperide*, ab *Hispanis Palo de calenturas*, id est *Lignum Febrium*: ejus cortex inter orbis *Americani* divitias notissimus ad nos devehitur crassitie mediocris, substantiâ tenuis, foris scaber, passimque exili canescens musco, intùs lævis, colore ferrugineus, qualis est *Cinnamomi*, amarus, & terræ quâdam admixtâ portione austerus. Affertur ex *Peruviano* Regno, cortex dictus *China Febris*.

Lacca

Lacca, Gummi quoddam eſt, quod ex *India* mauritani petunt, eoque etiam in ſuis compoſitionibus utuntur, ut in *Dialacca*. Melior eſt quæ ſyncera eſt, lignique fragmentorum expers, & quamvis prædura exſuccaque ſit, præmanſa tamen ſputum efficit ſanguineum, quod probitatis eſt indicium.

Ladanum, Liquor eſt ex *Ciſti*, *Ledon* appellati, foliis exſudans. Optimum, minimeque adulteratum, odoratum eſſe debet, ſubviride, facilè molleſcens, pingue, reſinoſum, arenularum aliarumque ſordium expers, quale in *Cypro* gignitur.

Lapis Armenius, eſt ſimilis *Lapidi Lazuli*. Præfertur, qui eſt maximè viridis, communicato colore cum cæruleo, lævis, perquam æquabilis, tactuque friabilis. Ejus loco *Lapis Lazuli* uſurpari poterit.

Lapis Judaicus. In *Judæa* naſcitur *Glandis* effigie, candidus, ſcitâ admodùm configuratione, lineis æqualiter inter ſe diſtantibus, quaſi induſtriâ detornatis. Paſſim in officinis habetur.

Lapis Lazuli, apud *Arabes* is eſt, quem *Cyaneum Græci* nominant, effoditur in *Orientalibus* auri fodinis. Præſtat, qui ſimilis eſt ſereno cælo, maculas quaſdam aureas, ſtellarum modo radiantes habens, & aliorum Lapillorum mixturæ expers. Duplex habetur: *Orientalis*, & qui ex *Germania* adfertur; *Orientalis* ex eo cognoſcitur, quod in igne colorem non amittat, ſed illuſtrior reddatur; *Germanicus* verò hebe-

hebetatur, & de colore remittit.

Lapis Nephriticus, in Nephritico dolore maximè laudatus, ex *nova Hispania* defertur. Variegatus eſt & *Praſſio* ſimilis, ad viridem colorem lacteo permixtum tendit; præfertur viridior.

Lapis Pyrites, vulgò *Marchaſita*, gignitur autem *Marchaſita* (ut rei metallicæ periti tradunt) ex impuro Metallorum halitu: quo fit ut ferè ſemper reperiatur in montium cacuminibus, præfertur qui ærei coloris eſt.

Lignum Guajacum, *Hagioxylon*, *Lignum ſanctum*, *Lignum Indicum*, eſt primum celebratiſſimorum illorum ſimplicium, quæ ex *Occidentali India* deferuntur. Sunt verò *Guajaci* genera tria, primum defertur ex *Inſula ſancti Dominici*, ſecundum ex *Inſula S. Joannis de Portu divite*, quod poſteà repertum ſuperiori ferè ſimile, ſed per omnia minùs, & penè ſine matrice, ſuperiore tamen odoratius & amarius, quod illi præponitur, & ob mirandas facultates *Lignum ſanctum* dicitur. Multæ ſunt Inſulæ in Oceano, in quibus *Guajacum* naſcitur, ut *S. Benedicti*, *Hiſpaniola*, *S. Crucis*, *S. Dominici*, *S. Joannis de Portu*: ægregium tamen in *Inſula S. Joannis* oriri exiſtimatur: ſed cum hoc Ligno naves onuſtæ, in *Hiſpaniam*, *Genuam*, *Venetias* afferantur, nec ratione loci dignoſci poſſit, ex ipſius dotibus eligendum, quod ponderoſum eſt, corticem adhærentem habet, gravem odorem obtinet, & aquam, in qua

co-

coquitur, facilè tingit. Tertium genus in *Orientalibus* reperitur. *Lignum Guajacum*, nonnulli ad *Buxi* ſpeciem, alii ad *Ebeni Dioſcoridis* alteram ſpeciem non quidem malè retulerunt, alii novum arboris genus eſſe cenſuerunt: grave eſt hoc Lignum ut in aquis ſtatim ſubſideat, non fluitet. Cortex ejus æquè atque Lignum in uſum venit, quem nonnumquàm *Fraxini Cortice* adulterari contingit, aut ſimilibus, qui tamen dignoſcuntur ſapore, & odore quodam peculiari.

Lignum Nephriticum, ex *nova Hiſpania* mittitur, quod cinereum eſt, craſſum, enode. & exiguo ſpatio aquæ injectum, eam cæruleo colore tingit, qui ſenſim intenditur pro temporis diuturnitate, cæruleum ideò dictum, quoniam adulteratur alio ligno ſimili, quod aquam croceo colore inficit, ne quis fallatur.

Malobatrum, eſt folium *Indicum*, *Nardo Indico* odore & ſapore ſimillimum, ſed *Nardo* efficaciùs. Laudatur recens ex candido nigricans, fractu contumax, integrum, & odore vegeto nares feriens. Eſt autem *Malobratum* folium ſui generis, quod *Indicæ* gignunt palludes, *Lentis paluſtris* modo innatans aquis ſine radice, id ipſum collectum ſtatim lino trajicitur, ſiccatumque reconditur. In ejus locum *Mauri* invexerunt folium *Lauro* proximum, ſed majus, & nervis tribus folium intercurſantibus diſtinctum odore jucundo. Ejus ſuccedaneum eſt *Spica* tam *Indica* quam

Cel-

Celtica, vel *Caſſia lignea* vera, aut potiùs cortex externus *Citri* ſiccatus.

Manna, eſt veluti ros cæleſtis dulcis & gratus, qui ex aëre ſudoris inſtar exudans, ſublucanis horis ſuper frondes & ramos arborum, herbarumque delabitur, & brevi *Gummi* modo concreſcit. Præfertur *Calabrina*, & inprimis quæ ſtirpium frondibus inſidens colligitur, proindè *Foliorum Manna* cognominata, minutis granulis ſimilis, candida, guſtu dulcis, recens atque ſuavis. Secundas partes ſibi adſciſcit quæ ramis inſidet; tertias verò quæ lapidibus & ſolo inhæret, nimirùm hæc granulis conſtat craſſioribus, & colore longè minus ſyncero.

Manna Thuris, ſunt minutiſſimæ *Thuris* micæ. Laudatur alba, pura, micarumque frequentiâ prædita. Sunt qui cribratâ *Pini* reſinâ ac polline, aut cortice *Thuris* contuſi adulterant, ſed hæc igne deprehenditur: nam adulterata non æqualiter incenſa flagrat, ſed fuliginoſum & impurum vaporem expuit, variumque odorem habet.

Margaritæ, ex Conchis quibuſdam, ſeu Piſcibus teſtaceis, *Oſtreorum* valdè ſimilibus in *Indico mari* victitantibus ſumuntur, quæ ſi parvæ fuerint, *Margaritarum* nomen ſervant; ſi craſſæ & ponderoſæ, *Uniones* appellantur. Præferuntur *Orientales* candiſſimæ, lucidiſſimæque: Perſicæ & perforatæ improbantur.

Marum, herba eſt non diſſimilis *Majoranæ*

ranæ, cujus loco accipitur *Dictamnus Creticus*, vel *Majorana*.

Mastiche, resina *Lentiscina*, *Mastix*. Est resina quæ *Lentisci* trunco vulnerato, primum liquida distillat, dein paulatim in guttas densatur, foris candida aut flavescens propter inhærentem pulverem, quo absterso, propemodùm crystallina & translucens. *Lentiscus Mastichem* eructans, est arbor admodùm procera; non tantùm in *Chio* & *Ægypto*, sed & in certis locis *Italiæ*, ut in *Apulia* reperitur. Ex ejus ligno Dentiscalpia fiunt optima, quibus non modò repurgantur dentes, sed roborantur, gingivæ constringuntur, & ori suavitas conciliatur. Præfertur resplendescens, & candore Hetruriæ Ceræ similis, retorrida, crassa, odorata, friabilis, stridorem edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur *Thuris*, resinæque *Pineæ nucis* mixtione.

Mechoacan, *Mechoaca*, *Mechoacana*, *Peruviana Mechoaca*, *Bryonia Mechoacana* (quod radix *Bryoniæ* sit similis, à qua tamen multum differt, quod *Bryoniæ* radix viridis & sicca, admodùm acris, *Mechoacan* verò insipida & sine acrimonia) *Mechoacan* radix diligenda est recens, intùs albicans, exteriore parte nonnihil cineritia, crassa, compacta, multis circulis distincta, nullius mali saporis particeps, & sine acrimonia. Improbatur valdè candida, nigra, & cariosa. Quæ in Quito, & circa *Nacuragua* nata, præstantior est priore.

Meu folia tenuia ſunt anguſta, Capillacea; ſurculi graciles Cubitales, in quorum ſummitatibus prodeunt umbellæ cum floſculis candidis; radices admodùm tenues ſunt & odoratæ, quarum in officinis uſus eſt.

Moſchus. Eſt autem *Moſchus*, & excrementi, & Animalis, à quo idipſum habetur nomen. Animal verò exoticum eſt, idque *Indicum* in Regno *Pegu*, ac potiſſimum in *Agro Tumbaſcorum* admodùm frequens, *Capræ* non multùm diſſimile, ac corpore prægrandi *Dorcadem Moſchi*, *Gazellam Indicam* & *Capreolum Moſchi* nominant.

Huic cum *Veneris* æſtro percellitur, furoris vehementiâ *Umbilici Regio* intumeſcit, ibique congeſto ſanguine multo & craſſo, fit apoſtema: atque tum ferum illud Animal potum cibumque averſatur omnem, & humi ſeſe provolvens, atque lapidibus & arborum truncis turgentem partem quâdam voluptate confricans, diſrumpit ac vomicam aperit, ex qua ſanies quædam excernitur, quæ verus eſt *Moſchus* omnium rerum odoratiſſimus & ſuaviſſimus, quique alias omnes *Moſchi* varietates, quæ nunc multæ circumferuntur, bonitate ſuperat.

Illa autem ſanies, ſuper arborum truncis aut ſaxis relicta, calore Solis, ac cæli bonitate coquitur, claboratur, & viroſus ipſius odor, ſi quis ſit, diſſipatur, fitque præſtantiſſimus ille *Moſchus*, quo Reges

&

& Magnates donantur & utuntur; quod verò passim venditur, bonitate longè inferior est, & ab Animalibus venatu captis carpitur. Captâ enim Ferâ, Venatores partem cum corio simul abscindunt, cruorem effluentem exprimunt, colligunt, exsiccant, & servant cum utriculis aut pellibus eorumdem Animalium, quorum sæpè sanguis exsiccatus, pauculæ recrementi, dicti portioni commixtus, pro puro *Moscho* ab institoribus seu adulteratoribus venditur. Qui verò suapte naturâ in Animalis utriculo sibi maturitatem comparavit, hic verus & optimus est *Muscus*.

Est quoddam genus *Mustellæ* majoris, quæ quod Martia sit & pugnax (Gallinas enim etiam grandiores enecat) quibusdam *Martes*, aliis *Marturella*, vulgò *Fovina* dicitur, cujus excrementa *Moschum* redolent.

Sunt & quædam plantæ & fructus, qui hujus aromatis suavitatem naribus & palato referunt, ut *Geranium Moschatum*, *herba Moschata* dictum, *Rosæ Moschatæ*, & *Pyra Moschatellina*.

Myrobalani quinque generibus distinguntur, videlicet in *Citrinas*, *Chebulas*, *Emblicas*, *Indas*, & *Bellericas*. *Citrinæ* laudantur multum flavæ, in viride inclinantes, densæ, graves, gummosæ, cortice crasso os parvum complectente. *Chebulæ* quò majores, cò meliores, nigræ in rubrum inclinantes graves, quæ aquæ impositæ statim merguntur, cortice crasso. *Indæ* optimæ sunt

nigræ, ſubſtantiâ ſolidâ, ſi frangantur denſæ, magnæ, graves ſine oſſibus. *Emblicæ* ſunt magnæ, graves, denſæ, carne multâ, oſſibus exiguis. *Bellericæ* verò, denſæ, magnæ, graves & cortice craſſo, quæ his notis carent, aut vetuſtate exoletæ, aut aliud incommodum paſſæ ſunt.

Myrrha, *Arabicæ* arboris lachryma eſt. Laudatur quæ ſubviridis eſt, pinguis, ſplendens, reſinoſa, mordens, foris undique concolor; ſi frangatur, venas quaſdam unguium modo candidas intùs habens: taliſque eligenda quæ recens ſit, fragilis, lævis, amara inſuper & odorata. Inutilis eſt nigra, aut piceo colore, gravis, retorrida & pinguedine carens.

Nardus, officinæ *Nardi ſpicam* appellant, cujus duo ſunt genera: unum *Indicum*, alterum *Celticum*. *Indicum* perquam odoratum ſit, recens & læve; haudquaquàm pulverulentum, *Cyperum* redolens, brevi ſpicâ, amaro ſapore linguam ſiccante, quod diù in ſua odoris gratia permaneat. *Celticum* verò in *Liguriæ alpibus* naſcitur: laudatur maximè recens, jucundi odoris, radice numeroſâ cohærens, plenum & non fragile. *Nardum ruſticam Lavendulam* vocamus.

Opium ſuccus eſt è capitibus papaveris nigri. Trium eſt generum: unum ex capitibus & foliis expreſſum, *Græcis Meconium* vocatur, quod ignavius: alterum lachryma eſt ex capitibus paululùm inciſis extillans, quæ verum eſt Opium. Optimum eſt

 denſum,

densum, grave, amarum, odoratu soporiferum, quod facilè *Aceto* dissolvitur, lene candidum, neque asperum neque grumosum, quod colatum non statim uti cera coëat, quod in Sole diffundatur, & admotum lucernis clarâ non atrâ luceat flammâ, & extinctum odoris vim conservet. Adulteratur *Glaucio*, hoc est *Mentha* aut Gummi, aut silvestris *Lactucæ* succo. Verùm *Glaucio* fucatum in dilutione, *Croci* colorem reddit; *Lactuca* depravatum inodorum est, & asperius: Gummi vitiatum, infirmum est & splendescit.

Opoponax, succus est effluens ex incisa radice, aut caule *Panacis*, quod *Dioscoridi Heracleum* dicitur. Commendatur quamamarissimus, interne albus aut subfulvus, foris colore croceo, lenis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquescens & gravi odore. Niger improbatur ac mollis, nec non Ammoniaco aut cerâ adulteratus; sed synceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resolvatur, & lactescet.

Rhabarbarum, in interiore *Sinarum* Regione provenit; undè in urbem *Cantan* (nobilissimum totius Provinciæ Emporium) exportatur, & inde navibus in *Indiam* advehitur. Optimum est si odore nares feriat, compactam simul habeat substantiam, aureo sit colore, aureisque ac ruffis venulis abundè distinctum, gustu amarum, grave pro lævitate sua, & quod madefactum croceo colore manum fricantis tingat. Conservatur per annos tres aut

quatuor integrum incorruptumque, ſi cerâ ſolâ, vel cerâ cum *Terebinthina liquata* circumlinatur, aut *Melle albo*, aut *Pſyllio*, aut *Milio* mergatur.

Rhaponticum, ex *Septentrionali* plaga advehitur, optimum habetur quod teredines non habet, guſtuque ſubacri cum remiſſa aſtrictione lenteſcit: ejus radix nigra eſt, *Coſto nigro* foris, *Centaurio magno* intùs ſimilis, ſed minor, & magis rufa, fungoſa & laxa, aliquantulùm lenis, ſine odore, quæ manſa colorem reddit pallidum ad *Crocum* inclinantem, fragilis & amara.

Rubinorum multa ſunt genera, ſed nobilior ille *Rubinus* vocatur, cujus nitor vivacior ſit cæteris, & rubore ſit ſplendens & elegans: à rubore non ſine ratione appellatus eſt *Rubinus*, optimus in Flumine *Pegu* reperitur, durus & frigidiſſimus.

Sagapenum, quod officinis *Serapinum* dicitur, eſt ſuccus *Ferulaceæ* herbæ in *Media* naſcentis. Laudatur tranſlucens, fulvo forinſecùs colore, intùs albido, & quid inter *Laſer* & *Galbanum* redolens, guſtu acri, ſubſtantiâ craſsâ, & facilè in aqua reſolubile, quod his caret notis, adulteratum & ſpurium cenſetur.

Sandaracha, Lapis eſt in Metallicis venis, plerumque cum auripigmento naſcens: ideò *Serapioni* auripigmentum rubrum dicitur: rufa eſt nonnihil ad luteum vergens, quæque cùm uritur fumum emittit pallidum, ſulphuriſque virus redolet

etsi non consumatur. Animadvertendum est, quod *Sandaracha* non sit vernix scriptoria, ut aliqui putant; si quidem nihil aliud hæc est, quàm *Gummi Juniperi*, quod à *Mauritanis Sandarax* dicitur.

Santalum, est triplex, pallidum, album & rubrum, quæ genera non nascuntur in una Provincia, sed magna est locorum distantia. Pallidum, quod & Actuario dicitur *Santalum Citrinum*, *Santalum luteum*, *aromaticum*, *odoriferum* aliis præfertur; quia odoratius. Num verò id habeamus, valdè dubitandum, quandoquidem scribit Garcias ab horto vix in *Lusitaniam* deferri, quoniam ejus pretium majus sit apud ipsos *Indos*, quàm apud *Lusitanos*. Fieri igitur poterit, ùt aliquod aliud odoratum lignum, ut *Cedri*, vel alterius arboris, nobis pro legitimo *Santalo*, obtrudatur, cùm & vulgare *Santalum Citrinum* acre sit, quale legitimum non est. In ejus defectu substituendum est, album seu candidum *Santalum*. Rubrum *Santalum* postremum locum obtinet, quod nullo commendetur odore, neque in iis locis nascatur, ubi cætera genera. Hoc decorticatum affertur, & *Ligno Brassiliano* dicto sæpè adulteratur; verùm licet utrumque sit inodorum, attamen *Santalum* neque dulce est, neque inficere debet. *Brassilianum* & dulce est, & inficit: ponderosior, quin etiam & solidior hujus materia, ideòque aquæ injectum statim fundum petit. Nostrum *Santalum* rubrum dulce est, & inficit; quare fortè

ſpurium & adulterinum erit dicendum.

Sapphyrus, eſt gemma pellucida, conſtans colore cæruleo ſive cyaneo, perquam tranſlucido, cælique ſereni colorem referens, ſplendore & perſpicuitate ſummâ; eſt gemmarum omnium duriſſima, Adamante excepto: optimus apud *Indos* reperitur.

Sarcocolla, cujuſdam arboris peregrinæ, & Gummi ab ipſa manantis nomen eſt. Naſcitur in *Perſide* fructuoſa & ſpinoſa ramis nodoſis, & arbori appreſſis, ex quibus ſauciatis, & interdùm ſpontè profluit lacryma *Thuris pollini* ſimilis, colore ſubruſa, amara ſapore citrà morſum, dulcedinem *Glycyrrhizæ* referens. Adulteratur Gummi, ſed guſtu deprehenditur, adulterata enim amara non eſt.

Sarſaparilla, planta eſt multis radicibus nitens, duos cubitos aut ampliùs longis, colore cinereo dilutior, quæ interdùm tam altè demittuntur, ut qui integras eruere volet, ei profundâ foſſione opus ſit. Ex *Hiſpania nova*, & Provincia *Honduras* transfertur. Matthiolus & Dodonæus putant eſſe eamdem cum *Smilace noſtrate*; diſſident tamen inter ſe multum, nam *Smilacis aſperæ* radix nodoſa eſt, & geniculata, graminis ritu, multoque brevior & mollior. Enodis verò eſt *Sarſaparillæ* radix, nullis geniculis aſperata, dura, fibroſa, rugoſa, medulloſa, & aliquando viginti pedes longa, atque Viminis inſtar facilè finditur. Deligenda eſt candida ad

pal-

pallorem tendens, recens, non carioſa, ſed medulloſa, fractu contumax & ponderoſa: nam quæ cariem ſenſit, & dum frangitur pulverulenta eſt, inutilis exiſtimanda.

Saſafras arbor magna eſt, folia ferens ficulneis ſimilia, & in tres partes diviſa, ſtipites leves, ſubrubeos, & fœniculum olentes. Naſcitur in Provincia *Florida* & *Mechuanenſi*, ejus lignum optimum eſt recens, acri ſapore præditum, ad cinereum colorem tendens, atque ſuum corticem retinens: nam quod cortice caret, vile & invalidum cenſetur.

Scammonii nomine ſuccus plantæ cujuſdam concretus, & planta ipſa intelligitur, quibuſdam tamen magis propriè hæc *Scammonia*, ille *Scammonium* dici videtur. Eſt verò planta lactaria, volvuloſa, ſcanſoria, lævis *Smilacis* modo, cui foliis, flore, & facie valdè ſimilis eſt, ſed radice non parùm diſſimilis, quæ in *Smilace* tenuis eſt, in *Scammonio* craſſa, prælonga, intùs candida, odore gravis, & multo ſucco prægnans; ex eaque tenues & viticuloſi ſurculi prodeunt, qui vicinos frutices conſcendunt, amplexantur, & ſe implicant, folia ei lata & acuminata ſunt inſtar *Ariſari*, ſed minora. Flores albidi, concavi, Calathi figura; naſcitur uberiùs in pingui ſolo, præſertim in *Antiochia* & *Syria*. Ex ipſius radice *Scammonium* vulgò dictum, ſeu liquor colligitur plurimis modis, ut videri poterit ex Rænodeo, Theodoro &

Cor-

Corbeio. *Mesue* laudat *Antiochenum*, subalbum, Gummi modo clarum, aut varium, quod fractum salivæ aut aquæ contactu lactescat, fractu facile, læve, odoris non tetri. *Dioscoridi* probatur læve, nitidum, rarum, fungosum, venulis exilibus. Adulteratum quoque aquæ contactu lactescit; sed adulterium vehementi acrimoniâ deprehendi ait.

Schœnanthum, id est *flos Junci odorati*, omnibus notum. Eligendum rufum, intenso colore, recens, tenue, rubentibus fragmentis, quod manibus fricatum Rosæ odorem emittit, igneæ mordacitatis ad linguam, eligatur floribus refertum, si fieri potest.

Sena duplex habetur, una est acutioribus angustioribusque foliis, quæ ex *Alexandria Ægypti*, vel ex *Syria Venetia* defertur, & vocatur *Sena Orientalis Alexandrina*, *Syriaca*, *Ægyptia*, *Sena minor*. Altera est latioribus rotundioribusque foliis, & in *Italia* spontè, vel lævi culturâ æstivis tantùm mensibus provenit, undè magna copia deportatur. Hæc vilior est, & *Orientali* longè inefficacior, ita ut hujus uncia tantum præstet, quàm *Orientalis* semiuncia. Probatur recens, viridis, probè resiccata, non maculosa, nec teredine exesa, nec stipitum admixtione fraudata. Ejus folliculi foliis præferuntur recenter siccati, colore è viridi obscuro, & *Senæ* odorem referentes; evanidi namque, seminibus vacui, putidi, ac male olentes purgatoriâ vi destituuntur.

Smaragdus, quo nihil viridius, tanti ſplendoris exiſtit, ut oculos intuentium perſtringat: tranſlucidus debet eſſe, nitens & colore excellens; ejus bonitas cognoſcitur, ſi in os ſumptus frigidus ſentiatur, & carbonibus injectus non ardeat, nec flammam emittat.

Styrax Calamita ſuccus eſt arboris cujuſdam *Syriacæ*, qui è *Pamphilia* advehitur intrà calamos, ne quid ſuavis odoris amittat. Præfertur rufeſcens, craſſa, ſpinoſa, albicantibus grumis plena, odore jucundo atque perſeverante dotata. Deterior nigra, furfuroſa, ſitu obducta & inodora; adulteratur ligni ipſius ſcobe, melle, cerâ, adipe odoribus imbuto, & quibuſdam aliis; dignoſcitur, quod adulterata invalido ſit odore; ſincera verò admodùm acris ſit.

Succini tres præcipuè ſunt differentiæ ex colorum varietate: prima lutea eſt, gratâ perſpicuitate tranſparens, auri colorem repræſentans: altera alba, imò candidiſſima eſt, rara, ſed optima: tertia obſcura, confuſos & variè mixtos colores obtinens. Probatur illa, quæ attritu calefacta illicò paleas, aliaſque res minutas ad ſe trahit, fulva ac tranſlucens, & quæ accenſa *Bituminis* odorem reddit.

Tacamahaca ex *nova Hiſpania* defertur, eſt Gummi ſeu reſinæ genus collectum è vulnerata arbore magna, inſtar *Populi*, admodùm odorata, cujus fructus eſt ruber, *Pæoniæ* ſeminis modo.

Tamar-

Tamar-Indus arbor eſt, in qua naſcuntur *Tamarindi*, procera, *Coſtaneæ* aut *Fraxini* modò, dura, compacta, multis cincta ramis, & foliis armata minutim inciſis palmi magnitudine. Fructus hi immaturi virent, & acidi ſunt; maturi ſubcineritii, eorumque tunc aciditas ſuavitate non caret. Probantur colore nigro ruføſcentes, multis villis intertexti, recentes, lenti, pingues, vinoſi, jucundâ tamen aciditate grati, nucleos intùs continentes ſativorum *Lupinorum* magnitudine, quodammodò rotundos, ſed planos, colore fulvos, & leves. Servantur in fictile vitreatum coacti, loco frigido & ſicco. Adulterantur *Prunorum* carne, ſed in his nigredo eſt obſcura, humidiores ſunt, & *Prunorum* odor & ſapor illis ineſt.

The herba, ſeu *Frutex Chinenſi*, *Tſia* verò *Japonibus*, eadem ſunt. Foliorum decoctum illis *The*; his *Tſia* itidem dicitur, licet *Chinenſium Tſia* ob majorum foliorum macerationem, & coctionem nigrum *The* appelletur. *Japonenſium Tſia* ob minimorum in ſummitate fruticis foliorum præparationem gratioris utique ſit ſaporis, majoriſque efficaciæ, ac altioris quoque pretii. Omnis *The*, ſive *Tſia*, nullibi terrarum (quantum quidem conſtat) niſi in *Japoniæ*, *Chinæ*, & *Chiam* campis colitur; exſurgitque ad *Ribeſiorum*, vel *Roſæ Europææ* molem & altitudinem. Caules & ramuſculi totius fruticis à pede uſque ad verticem perpetuis & infinitis floribus & ſq-

foliis tenuibus acuminatis, in ambitu crenatis, incisis & dentatis instar serræ, ornatè vestiuntur. *Bellidis* aut *Chamæpityos* foliis similibus, ab acetosa silvestri diversis, &c.

Quæ ejusdem licet formæ, diversæ adeò sunt magnitudinis, ut quinque differentiæ foliorum uni, eidemque frutici adnatorum appareant. Prima & maxima in inferioribus ramusculis, *Balsami hortensis* foliis simillima existunt. His succedunt ea, quæ secundæ magnitudinis, & prioribus multò minora sunt, ut sic gradatim ascendentia quinquies manifestè differant.

Verùm quantum hæc folia sursùm magnitudine decrescunt, tantum pretio accrescunt. Hæc Guilielmus Piso in annotationibus ad historiam naturalem & medicam *Indiæ Orientalis*, Jacobi Bontii paginâ 87. 88. 89. quippè primæ magnitudinis exsiccatarum & præparatarum libra valet quinque asses; secundæ quinquaginta; tertiæ verò quinque florenos; quartæ quindecim; quintæ & ultimæ magnitudinis quinquaginta: imò subindè centum & quinquaginta florenos valet, si ritè præparata fuerint folia.

Flores porrò fert *The* albicantes, magnitudine, figurâ, colore, *Rosæ silvestri Europææ* (quæ *Eglancier* vocatur) excepto odore, simillimos. Quorum foliolis decidentibus, umbilicus manet, ubi semen horum fruticum rotundum, & nigrum continetur *Rosarum* instar, quod terræ

com-

commiſſum novas producit plantas trien-nii ſpatio. Ex quorum foliis meſſis lucu-lenta illis annuatim redit, etiam iis *Japo-niæ* locis, ubi gelu & nix vigent æquè ac in *Hollandia*. Radices ſunt fibroſæ, & in minimas particulas diſperſæ circa terræ ſuperficiem, nullius hactenus uſus habitæ: ita ut ſola hujus decantatæ plantæ ſeu fru-ticis præſtantia in frondibus exiſtat, quæ VERE *Japonenſi* lectæ & in umbra exſicca-tæ ad quotidianas decoctiones reſervan-tur. Quantùm ad ſaporem foliorum *The*, præter amaritudinem & calorem, aroma-ticum quid, & tenuitatem partium præ-dominantem potiùs, quàm adſtrictionem, arguere videntur.

Petrus Borrellus hiſtoriarum, & obſer-vationum rariorum Medico-Phyſicarum Centuria 3. obſervatione 39. de *Thea* ſic inquit: In duabus tantùm *Chinæ* Provin-ciis arbor *Thea* dicta reperitur, ex Alexan-dri de Rhodes peregrinationum hiſtoria, quæ *Bellidis* folia habet, & in una quàm in alia major eſt. Magnis curis colligun-tur hæc foliola ſemel in anno (ut nos hîc in Gallia Uvas colligimus) ex arbore *Myrti* folio prædita. Bulliuntur in aqua, & tunc extendi poſſunt, & eorum forma percipi, &c.

Terebinthina vera ex *Terebintino*, ſeu *Terminthο* arbore (ut *Græci* dicunt) habe-tur. Eſt enim liquor pinguis ex ejus trunco & ramis defluens. Optima eſt clara, per-lucida, alba, acris & odorata. Laudatur

quæ ex *Chio Insula* defertur, *Chia* ob id nuncupata: hæc odore & gustu cæteris antecellit, & plus *Terebinthi* refert. Quæ cùm ad nos non advehatur, *Abietina*, quæ ex *Abiete* aut *Laricea*, quæ ex *Larice* effluit, loco illius substitui possunt.

Terra Lemnia præstantissima habetur, quæ ex *Insula Lemno* defertur, in placentulas efformata, ac aliquo plerumque sigillo obsignata, & ideò sigillata vocatur, rufo plerumque est colore, pinguis adeò, ut è sævo constare videatur, dum in ore contenta linguæ & labiis admovetur.

Thus est arbusculæ cujusdam in *Arabia* nascentis lacryma resinosa. Duo traduntur genera: unum dicitur *Olibanum*, seu *Thus masculinum*, quod ex albo flavescit, limpidum, pellucidum, pingue ac siccum est, resinæ *Cedriæ* puritatem, succinique nitorem emulatur. Alterum *fœmininum*, quod bonitate *masculo* cedit, resinosum magis ac molle, & citò ardens. Adulteratur admisto *Pini* aut *Nucis* ejus cortice; sed horum index ignis est: siquidem reliqui cortices suffiti, nequaquam incenduntur, & sine odore fumum eructant: *Thuris* verò cortex ardet, & cum odoris fragrantia vaporem ejaculatur.

Tragacantha est lacryma, quæ ex plantæ *Tragacanthæ* radicibus colligitur, & per cribrum aut rarum linteum exprimitur, candida, pellucida, nitida (licet & flavescens subrufa reperiatur) substantia est glutinosa, quæ difficulter teritur, & aquam,


quâ

quâ diſſolvitur, in denſam mucilaginem inſtar glutinis convertit. Eligenda candidiſſima, parùm tranſlucens, gracilis, lævis, ſyncera, ſubdulcis, & cujus minima portio maximam aquæ copiam coagulat. Quæ eſt antiquata, primùm palleſcit, deindè ruſeſcit, tandem etiam flaveſcit, fitque hæc annis amara, ob idque calidior, atque ideò ad confectiones calidas potiùs adhibenda. Adfertur ex *Creta*, *Aſia* & *Græcia*. Planta, ſeu Arbuſcula *Tragacantha*, etiam in *Italiæ* quibuſdam locis reperitur.

Turbith. Præfertur intùs ſubalbum, foris cineritium, fractu facile, recens, & cujus caulis pars radici proxima, gummoſa eſt. Improbatur vetus aut carioſum, quia viſcera conturbat.

Xylobalſamum, lignum *Balſami* legitimum nondùm in officinis proſtat, quale requirit *Dioſcorides*, recens, ſarmento tenui, fulvum, odoratum, quadamtenùs *Opobalſamum* ſpirans. Quod verò pro eo oſtenditur *Xylobalſamum* officinarum, alterius cujuſdam arboris virgultum eſt, & potiùs *Myrtum* quàm *Balſamum* refert. Hinc fortè *Lentiſci* (in *Italia* naſcitur) ſurculi; modo non carioſi ſint, ſed recentes, nec odorem amiſerint, & exſiccantes, moderatè quin & aſtringant, & aromatici ſint. Alii tamen *Macis* & *Cyperi* æquales partes, alii *Santalum* flavum, alii *Cubebas* ſubſtituunt.

INDEX



INDEX MEDICAMENTORUM COMPOSITORUM IN HAC PHARMACOPOEA CONTENTORUM.

Aceta.

Antidota & Opiata.

N The-

Aquæ simplices Stillatitiæ, 13

Aquæ Compositæ.

Spiritus ardentes.

Juni-

Cerata.

Condita. 49

Conservæ & Saccharata. 50

Decocta.

Electuaria solutiva.

Emplastra.

Looch ſanum & expertum. 46

Mellita.

Olea per expreſſionem.

Olea Simplicia per infuſionem & Decoctionem.

Olea Composita per infusionem & Decoctionem.

Olea per destillationem.

Pillulæ.

Sple-

Extractorum conficiendorum modus generalis. 83

Pulveres Aromatici & alii.

Pulveres ſolutivi.

Rob.

Syrupi.

De

Tabellæ.

Tincturæ.

Trochiſci.

Unguenta.

Nu-

Præparationes Simplicium Medicamentorum.

Medicamenta Spagyrica.

Vitrio-

De Salibus fixis & Volatilibus.

FINIS.

Harwood